

(案)

ジノテフラン 農薬蜜蜂影響評価書

2026年9月10日

農業資材審議会農薬分科会

農薬蜜蜂影響評価部会

目 次

<経緯>	2
<農薬蜜蜂影響評価部会委員名簿>	2
I. 評価対象農薬の概要	3
1. 有効成分の概要.....	3
2. 有効成分の物理的・化学的性状.....	4
3. 申請に係る情報.....	5
4. 作用機作.....	5
5. 適用病虫害の範囲及び使用方法.....	5
II. ミツバチに対する安全性に係る試験の概要	10
1. ミツバチに対する安全性に係る試験	10
2. ミツバチ個体への毒性（毒性指標）	12
3. 花粉・花蜜残留試験.....	19
4. 蜂群への影響試験.....	23
III. 毒性指標.....	27
1. 毒性試験の結果概要.....	27
2. 毒性指標値.....	27
3. 毒性の強さから付される注意事項.....	28
IV. 暴露量の推計及び暴露ごとのリスク評価結果.....	28
1. ミツバチが暴露しないと想定される適用	28
2. ミツバチが暴露する可能性がある適用	30
V. リスク評価結果（まとめ）	67
評価資料	71
評価資料（公表文献）	72

<経緯>

令和 4 年（2022年）12月 14 日	農業資材審議会への諮問
令和 5 年（2023年）12月 26 日	農業資材審議会農薬蜜蜂影響評価部会 （第11回）
令和 7 年（2025年）12月 22 日	農業資材審議会農薬蜜蜂影響評価部会 （第19回）
令和 8 年（2026年） 5月 28 日	農業資材審議会農薬蜜蜂影響評価部会 （第21回）
令和 8 年（2026年） 9月 10 日	農業資材審議会農薬蜜蜂影響評価部会 （第22回）

<農薬蜜蜂影響評価部会委員名簿>（第 11 回）

（委員）	（臨時委員）	（専門委員）
五箇 公一	山本 幸洋	稲生 圭哉
與語 靖洋		永井 孝志
		中村 純
		横井 智之

<農薬蜜蜂影響評価部会委員名簿>（第 19 回）

（委員）	（臨時委員）	（専門委員）	（専門参考人）
五箇 公一	中村 純	永井 孝志	並木小百合
山本 幸洋		横井 智之	與語 靖洋

<農薬蜜蜂影響評価部会委員名簿>（第 21 回）

（委員）	（臨時委員）	（専門委員）	（専門参考人）
五箇 公一	中村 純	永井 孝志	並木小百合
山本 幸洋		横井 智之	與語 靖洋

<農薬蜜蜂影響評価部会委員名簿>（第 22 回）

（委員）	（臨時委員）	（専門委員）	（専門参考人）
五箇 公一	横井 智之	永井 孝志	與語 靖洋
山本 幸洋		中村 佳子	
		並木 小百合	

ジノテフラン

I. 評価対象農薬の概要

1. 有効成分の概要

- 1.1 申請者 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社
- 1.2 登録名 ジノテフラン
(*RS*)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン
- 1.3 一般名 dinotefuran (ISO)
- 1.4 化学名
IUPAC名 : (*EZ*)-(*RS*)-1-methyl-2-nitro-3-[(tetrahydro-3-furyl)methyl]guanidine


N-methyl-*N'*-nitro-*N''*-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine
CAS名 : (CAS No. 165252-70-0)
- 1.5 コード番号 MTI-446

1.6 分子式、構造式、分子量

分子式

C₇H₁₄N₄O₃

構造式



分子量

202.22

2. 有効成分の物理的・化学的性状

試験項目			純度 (%)	試験方法	試験結果
色調・形状			99.6	目視	白色・固体(結晶)
臭気			99.6	官能法	無臭
融点			99.7	OECD 102	107.5 °C
沸点			99.7	OECD 103	測定不能 (208.3 °Cで分解)
密度			99.7	OECD 109	1.40 g/cm ³ (20 °C)
蒸気圧			99.7	OECD 104	<1.7 × 10 ⁻⁶ Pa (30 °C)
熱安定性			99.7	OECD 113	150 °Cまで安定
溶解度	水		99.7	OECD 105	39800 mg/L (20 °C)
	有機溶媒	ヘキサン	99.7	OECD 105	0.0090 mg/L (20 °C)
		ヘプタン			0.0105 mg/L (20 °C)
		キシレン			71.8 mg/L (20 °C)
		トルエン			149 mg/L (20 °C)
		ジクロロメタン			60.9 g/L (20 °C)
		アセトン			57.8 g/L (20 °C)
		メタノール			57.2 g/L (20 °C)
		エタノール			19.4 g/L (20 °C)
		酢酸エチル			5.17 g/L (20 °C)
解離定数 (pK _a)			99.7	OECD 112	12.6 (20 °C)
1-オクタノール／水分配係数 (log P _{ow})			99.7	OECD 107	-0.549 (25 °C)

試験項目	純度 (%)	試験方法	試験結果	
加水分解性	99.6	OECD 111	安定(25 ℃、60 日間、pH 4、7 及び 9) 半減期 1 年以上	
水中光分解性	99.6	9農産 第5089号	半減期 3.8時間 (滅菌精製水、25 ℃、400 W/m ² 、300~800 nm)	
紫外可視吸収 (UV/VIS) スペクトル	99.7	極大吸収波長 (nm)	吸光度	モル吸光係数 (L mol ⁻¹ cm ⁻¹)
		中性 (pH7)		
		268.6	1.3017	12500
		酸性 (pH2)		
		268.3	1.0469	12600
		アルカリ性 (pH11)		
		267.9	0.8869	10700
試験項目		試験方法	試験結果	
土壌吸着係数		OECD 106	K ^{ads} _{Foc} = 6~64 (6種類の土壌)	
土壌残留性		記載なし	・粒剤、水田土壌：半減期 1.0日または6.2日 (土壌の深さ0~10 cm、DFOPモデルによる推定値) ・粒剤及び水溶剤、畑地土壌：半減期 12.3日または20.2日 (土壌の深さ0~10 cm、DFOPモデルによる推定値)	

3. 申請に係る情報

ジノテフランは、海外において、2004 年に米国でレタス、葉菜類に登録された。2023 年現在、豪州、ブラジルを含む南北アメリカ諸国、韓国、中国、インド、その他のアジア各国、サウジアラビア、チュニジアを含む中東でも登録を取得している。

4. 作用機作

ジノテフランは、昆虫神経のシナプス後膜のニコチン性アセチルコリン受容体に作用し、シナプス伝達の遮断を起こし、殺虫作用を示す。

(IRAC : 4A※)

※参照 : <https://irac-online.org/>

5. 適用病害虫の範囲及び使用方法 (93 製剤、別添 1 参照)

- ・スタークル粒剤、アルバリン粒剤、ホクコースタークル粒剤、三井東圧アルバリン粒剤及びスターガード粒剤 (ジノテフラン 1.0 %粒剤)

- ・スタークル箱粒剤及び三井東圧アルバリン箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %粒剤)
- ・スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤、ホクコースタークル顆粒水溶剤、三井東圧アルバリン顆粒水溶剤及びわさび用緑風 SG
(ジノテフラン 20.0 %水溶剤)
- ・スタークル粉剤 DL、アルバリン粉剤 DL、ホクコースタークル粉剤 DL 及び三井東圧アルバリン粉剤 DL
(ジノテフラン 0.50 %粉剤)
- ・スタークルトレボン粉剤 DL
(エトフェンプロックス 0.30 %・ジノテフラン 0.50 %粉剤)
- ・ホクコーラブサイドスタークル粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・フサライド 2.5 %粉剤)
- ・ビームスタークル粉剤 5 DL
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)
- ・ビームバシスタークル粉剤 5 DL
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・メプロニル 3.0 %粉剤)
- ・側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤
(ジノテフラン 4.0 %・プロベナゾール 48.0 %水和剤)
- ・スタークル L 粉剤 DL 及びスタークルメイト L 粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %粉剤)
- ・スタークル液剤 10、スタークルメイト液剤 10 及びアルバリン液剤 10
(ジノテフラン 10.0 %液剤)
- ・スタークル 1 キロ H 粒剤及びスタークルメイト 1 キロ H 粒剤
(ジノテフラン 3.0 %粒剤)
- ・ビルダースタークル箱粒剤及びホクコービルダースタークル箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %粒剤)
- ・スタークルエアー50、スタークルメイトエアー50 及びファームスター顆粒水溶剤 50
(ジノテフラン 50.0 %水溶剤)
- ・ホクコーラブサイドスタークルフロアブル
(ジノテフラン 5.0 %・フサライド 12.0 %水和剤)
- ・ワイドナーエース粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・ブプロフェジン 1.0 %・フサライド 2.5 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)
- ・コラトップスタークル 1 キロ粒剤
(ジノテフラン 5.0 %・ピロキロン 15.0 %粒剤)
- ・イモチエーススタークル粒剤及びホクコーイモチエーススタークル粒剤
(ジノテフラン 1.67 %・メトミノストロビン 4.0 %粒剤)
- ・トレボンスター粉剤 DL

- (エトフェンプロックス 0.40 %・ジノテフラン 0.20 %粉剤)
- ・ビームエイトスタークルゾル
(ジノテフラン 10.0 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)
- ・トレボンスターフロアブル
(エトフェンプロックス 7.0 %・ジノテフラン 3.0 %水和剤)
- ・日農ビームアプロードスタークル粉剤 5 DL 及びクミアイビームアプロードスタークル粉剤 5 DL
(ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.0 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)
- ・ビームモンセレンスタークル粉剤 5 DL
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉剤)
- ・サジェスト微粒剤 F
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉粒剤)
- ・ビームモンカットスタークル F 粉剤 5 DL
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)
- ・スタークル豆つぶ、クミアイスタークル豆つぶ及びスタークルメイト豆つぶ
(ジノテフラン 12.0 %剤)
- ・Dr. オリゼスタークル箱粒剤、明治 Dr. オリゼスタークル箱粒剤及びオリザエートスター箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 25.0 %粒剤)
- ・ビームスタークル微粒剤 F
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉粒剤)
- ・ダブルカットスタークル粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.11 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)
- ・ホクコートップジンスタークル粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・チオファネートメチル 2.0 %粉剤)
- ・MIC ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤
(クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %粒剤)
- ・クミアイアプロードスタークルゾル及びアプロードスタークルゾル
(ジノテフラン 9.0 %・ブプロフェジン 18.0 %水和剤)
- ・キックオフ顆粒水和剤
(クロラントラニリプロール 4.0 %・ジノテフラン 15.0 %水和剤)
- ・アプロードモンカットスタークル F 粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.5 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)
- ・ホクコートップジンスタークルフロアブル
(ジノテフラン 5.0 %・チオファネートメチル 20.0 %水和剤)
- ・ダブルカットバリダスタークル粉剤 3 DL
(ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・

- バリダマイシン 0.30 %粉剤)
- ・ダブルカットスタークルフロアブル
(ジノテフラン 10.0 %・カスガマイシン 1.37 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)
- ・アトラクトン箱粒剤及びスターダム箱粒剤
(ジノテフラン 12.0 %粒剤)
- ・Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、明治 Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS 及びロングリーチ箱粒剤
(ジノテフラン 12.0 %・プロベナゾール 24.0 %粒剤)
- ・イッカツエース粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %粉剤)
- ・フェルテラスタークル箱粒剤 CU
(クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %粒剤)
- ・スケルカット顆粒水和剤及びスケルノック顆粒水和剤
(ジノテフラン 40.0 %水和剤)
- ・スターガードプラス AL
(ジノテフラン 0.010 %・ペンチオピラド 0.010 %水和剤)
- ・トライスタークル粉剤 DL 及びクミアイトライスタークル粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・テブフロキン 1.0 %粉剤)
- ・オールスタースプレー
(ジノテフラン 0.010 %液剤)
- ・ウッドスター及びウッドセーバー
(ジノテフラン 8.0 %液剤)
- ・ハイポネックス原液 殺虫剤入り
(ジノテフラン 2.5 %複合肥料)
- ・サンブラススタークル箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %・トルプロカルブ 12.0 %粒剤)
- ・ガッツスター粒剤及びゴウケツモンスター粒剤
(ジノテフラン 1.67 %・シメコナゾール 1.5 %・トルプロカルブ 3.0 %粒剤)
- ・サントリプル箱粒剤及びサンフェスタ箱粒剤
(クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %・トルプロカルブ 4.0 %粒剤)
- ・ハイパーキック箱粒剤及びゴウケツバスター箱粒剤
(ジノテフラン 12.0 %・トルプロカルブ 9.0 %粒剤)
- ・アースガーデン 4
(エトフェンプロックス 0.020 %・ジノテフラン 0.010 %・ミルベメクチン 0.00050 %・ペンチオピラド 0.010 %水和剤)
- ・スタートレボン W10

- (エトフェンプロックス 10.0 %・ジノテフラン 10.0 %乳剤)
- ブレードスタークルゾル
(ジノテフラン 10.0 %・フェリムゾン 15.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)
- ブレードスタークル粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)
- マグアンプ K 殺虫剤入り
(ジノテフラン 0.20 %複合肥料)
- オーケストラスタークルエアー
(ジノテフラン 9.0 %・ベンズピリモキサシ 10.0 %水和剤)
- ブレードスタークル R ゾル
(ジノテフラン 9.0 %・フェリムゾン 13.5 %・フサライド 13.5 %水和剤)

II. ミツバチに対する安全性に係る試験の概要

1. ミツバチに対する安全性に係る試験

1.1 毒性指標の検討に活用し得る試験の数

ジノテフランのミツバチに対する安全性に係る試験として申請者から提出された試験、公表文献に関する報告書及び公表文献に関する情報募集において寄せられた情報のうち毒性指標の検討に活用し得る試験の数を表 1-1 に示す。

表 1-1：毒性指標の検討に活用し得る試験の数

試験の種類	評価段階	申請者から提出を受けた試験*	公表文献に掲載の試験**
成虫単回接触毒性試験	第1段階	2	1
成虫単回経口毒性試験		2	0
成虫反復経口毒性試験		1	0
幼虫経口毒性試験		1	0

* 申請者から提出を受けた試験成績の数。

** 申請者から提出を受けた公表文献に関する報告書（計 2124 報）のうち、「農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会での公表文献の取扱いについて」の信頼性確認シートのチェック項目（6 項目）を満たした文献の数。

1.2 花粉・花蜜残留試験及び蜂群への影響試験の数

ジノテフランのミツバチに対する安全性に係る試験として申請者から提出された花粉・花蜜残留試験及び蜂群への影響試験の数を表 1-2 に示す。

表 1-2：花粉・花蜜残留試験及び蜂群への影響試験の数

試験の種類	評価段階	試験数
花粉・花蜜残留試験	第1段階	5
蜂群への影響試験	第2段階	2

（参考）公表文献の検索結果（別添 2 参照）（資料 15、16）

文献データベース（Web of Science Core Collection 及び J-STAGE）を用いて、2006 年 7 月 1 日～2021 年 7 月 3 日を対象期間として、有効成分名及びジノテフランを含む製剤名をキーワードとして公表文献を検索し、評価対象となる影響、評価対象となる生物種等についてガイドラインで定めるキーワードで絞り込みが行われた（システマティックレビュー）。

また、国際機関や欧米の評価機関の評価書に引用されている文献（2006 年以前に公表された文献も含む）も収集された（海外評価書）。

これらの検索結果に「公表文献に関する情報募集（2024年5月9日～6月7日）で寄せられた情報」等を加えた公表文献の検索結果を以下に示す。

システマティックレビューにおいて検索された、全分野の文献2124報のうち、「生活環境動植物及び家畜に対する毒性の分野」に該当する文献は、1006報で、このうち、第2段階適合性があると評価された文献は、22報であった。また、海外評価書からは、ミツバチ評価に関連する文献が7報確認された。一方、「公表文献に関する情報募集（2024年5月9日～6月7日）」において寄せられた情報の中に、ミツバチ評価に関連する文献は含まれていなかった。

これらを含め、セイヨウミツバチ (*Apis mellifera*) に係る文献について、「農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会での公表文献の取扱いについて」（令和4年8月5日 農業資材審議会農薬分科会農薬蜜蜂影響評価部会決定。以下「公表文献の取扱いについて」という。）に基づき内容を検討した文献は10報であった。これら10報のうち、農薬蜜蜂影響評価における「リスク評価パラメーター」である室内毒性試験の毒性指標（半数致死量（LD₅₀ または LDD₅₀））が報告されている文献は5報であった

半数致死量（LD₅₀ または LDD₅₀）の報告がない5報について、その多くは、帰巢飛翔、嗅覚学習、運動機能や姿勢制御等の行動異常をエンドポイントとした毒性試験に関する研究成果であったが、蜂群の維持に著しい影響を及ぼすことを示す結果ではなく、欧米を含めて、これらの行動異常と蜂群レベルでの悪影響との因果関係に関する知見もないため、現時点においては毒性指標の検討に用いないこととした。

室内毒性試験の毒性指標（半数致死量（LD₅₀ または LDD₅₀））が報告されている文献5報について、「公表文献の取扱いについて」の「1. (2) 結果の信頼性」の方法に基づき試験データの信頼性を精査したところ、このうち4報は被験物質や対照区の死亡率等の評価に必要な情報が明確ではなく、毒性指標の検討に活用し得る文献は1報であった。

なお、引き続き、行動異常に関する国内外の新たな科学的知見の把握に努める必要がある。

2. ミツバチ個体への毒性（毒性指標）

2.1 成虫単回接触毒性試験

(1) 接触毒性試験 1

セイヨウミツバチ成虫を用いた単回接触毒性試験が実施され、48 h LD₅₀ は 0.107 µg ai/bee であった。

表 2：単回接触毒性試験結果（資料 1、1999 年）

被験物質	原体					
供試生物/反復	セイヨウミツバチ(<i>Apis mellifera</i>)/ 5反復、10頭/区					
準拠ガイドライン	OECD TG214					
試験期間	48 h					
投与溶媒 (投与液量)	アセトン(1 µL)					
暴露量 (設定量に基づく 有効成分値) (µg ai/bee)	対照区 (死亡率 %)	0.012	0.025	0.049	0.098	19
死亡数/供試生物数 (48 h)	0/50 (0 %)	0/50	1/50	8/50	22/50	40/50
観察された行動異常	運動障害					
LD ₅₀ (µg ai/bee) (48 h)	0.107					

(2) 接触毒性試験 2

セイヨウミツバチ成虫を用いた単回接触毒性試験が実施され、48 h LD₅₀ は 0.056 µg ai/bee であった。

表 3：単回接触毒性試験結果（資料 3、2000 年）

被験物質	原体							
供試生物/反復	セイヨウミツバチ(<i>Apis mellifera</i>)/ 3反復、10頭/区							
準拠ガイドライン	OECD TG214							
試験期間	48 h							
投与溶媒 (投与液量)	0.1 % Triton X-100を含む水溶液(2 µL)							
暴露量 (設定量に基づく 有効成分値) (µg ai/bee)	対照区 (死亡率%)	助剤 対照区 (死亡率%)	0.0063	0.0125	0.025	0.05	0.1	0.2
死亡数/供試生物数 (48 h)	1/30 (3.3 %)	0/30 (0 %)	0/30	3/30	5/30	14/30	23/30	30/30
観察された行動異常	運動障害							
LD ₅₀ (µg ai/bee) (48 h)	0.056							

(3) 公表文献 1

セイヨウミツバチ成虫を用いた単回接触毒性試験が実施され、48 h LD₅₀ は 0.041 µg ai/bee であった。

表 4：単回接触毒性試験結果（資料 17、2019 年）

文献タイトル	Ecological toxicity reduction of dinotefuran to honeybee: New perspective from an enantiomeric level							
著者 (所属)	Chen, Z.L.; Yao, X.M.; Dong, F.S.; Duan, H.X.; Shao, X.S.; Chen, X.; Yang, T.; Wang, G.R.; Zheng, Y.Q. (State Key Laboratory for Biology of Plant Diseases and Insect Pests, Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100193, PR China)							
雑誌名等	Environment International, 130							
被験物質(純度)	Dr. Ehrenstorferより入手 (99.0 %)							
供試生物/反復	セイヨウミツバチ(<i>Apis mellifera</i>) / 3反復、10頭/区							
準拠ガイドライン	OECD TG214							
試験期間	48 h							
投与溶媒(投与液量)	アセトン(1 μL)							
暴露量 (設定量) (μg ai/bee)	対照区 (死亡率 %)	0.016	0.031	0.063	0.13	0.25	0.5	1
死亡数/供試生物数 (48 h)	<10 %	各区の死亡数の記載なし						
LD ₅₀ (μg ai/bee)(48 h)	0.041							
観察された行動異常	記載なし							

2.2 成虫単回経口毒性試験

(1) 単回経口毒性試験 1

セイヨウミツバチ成虫を用いた単回経口毒性試験が実施され、48 h LD₅₀ は 0.0137 µg ai/bee であった。

表 5：単回経口毒性試験結果（資料 2、1999 年）

被験物質	原体					
供試生物/反復	セイヨウミツバチ(<i>Apis mellifera</i>)/ 5反復、10頭/区					
準拠ガイドライン	OECD TG213					
試験期間	48 h					
投与溶液 (投与液量)	50 %ショ糖溶液(200 µL/区)					
助剤(濃度%)	なし					
暴露量 (設定量 (採餌量による補正值)に基づく有効成分換算値) (µg ai/bee)	対照区 (死亡率 %)	0.0025	0.0050	0.0089	0.019	0.032
死亡数/供試生物数 (48 h)	1/50 (2.0 %)	0/50	4/50	12/50	35/50	46/50
観察された行動異常	運動障害					
LD ₅₀ (µg ai/bee) (48 h)	0.0137					

(2) 単回経口毒性試験 2

セイヨウミツバチ成虫を用いた単回経口毒性試験が実施され、48 h LD₅₀ は 0.023 µg ai/bee であった。

本試験は対照区及び助剤対照区の死亡率についてガイドラインで示された要件を満たしていないことから参考資料とした。

表 6：単回経口毒性試験結果（資料 3、2000 年）

被験物質	原体							
供試生物/反復	セイヨウミツバチ(<i>Apis mellifera</i>)/ 3反復、10頭/区							
準拠ガイドライン	OECD TG213							
試験期間	48 h							
投与溶液 (投与液量)	50 %ショ糖溶液(200 µL/区)							
助剤(濃度%)	Triton-X100 (0.1 %)							
暴露量 (設定量 (採餌量による補正值)に基づく有効成分換算値) (µg ai/bee)	対照区 (死亡率%)	助剤 対照区 (死亡率%)	0.003	0.006	0.012	0.023	0.046	0.09
死亡数/供試生物数 (48 h)	4/30 (13.3 %)	5/30 (16.7 %)	9/30	8/30	8/30	17/30	26/30	30/30
観察された行動異常	運動障害							
LD ₅₀ (µg ai/bee) (48 h)	0.023							

2.3 成虫反復経口毒性試験

(1) 反復経口毒性試験 1

セイヨウミツバチ成虫を用いた反復経口毒性試験が実施され、10 d LDD₅₀ は 0.010 µg ai/bee/day であった。

表 7：反復経口毒性試験結果（資料 4、2015 年）

被験物質	原体				
供試生物/反復	セイヨウミツバチ(<i>Apis mellifera</i>)/ 4反復、10頭/区				
準拠ガイドライン	OECD TG213、OCSP 850等				
試験期間	10 d				
投与溶液	50 %ショ糖溶液				
助剤(濃度%)	なし				
暴露量 (実測量 (採餌量による補正值)に基づく有効成分換算値) (µg ai/bee/day)	対照区 (死亡率 %)	0.001	0.003	0.008	0.015
死亡数/供試生物数 (10 d)	0/40 (0 %)	0/40	1/40	15/40	38/40
観察された行動異常	瀕死及び運動障害				
LDD ₅₀ (µg ai/bee/day) (10 d)	0.010				

2.4 幼虫経口毒性試験

(1) 幼虫経口毒性試験 1

セイヨウミツバチ幼虫を用いた単回経口毒性試験が実施され、72 h LD₅₀ は >3.3 µg ai/bee であった。

表 8：幼虫経口毒性試験結果（資料 5、2015 年）

被験物質	原体					
供試生物/反復	セイヨウミツバチ(<i>Apis mellifera</i>)幼虫(4日齢時投与)/ 3反復、12頭/区					
準拠ガイドライン	OECD TG237					
試験期間	72 h					
投与溶液	ローヤルゼリー50 %、酵母エキス2.0 %、ブドウ糖9.0 %及び果糖9.0 %を含む水溶液					
助剤(濃度%)	なし					
暴露量 (実測量に基づく 有効成分値) (µg ai/bee)	対照区 (死亡率 %)	0.03	0.11	0.36	0.85	3.3
死亡数/供試生物数 (72 h)	5/36 (13.9 %)	10/36	6/36	5/36	5/36	7/36
LD ₅₀ (µg ai/bee)(72 h)	>3.3					

3. 花粉・花蜜残留試験

3.1 茎葉散布シナリオ

(1) 試験 1

開花初期にジノテフランを散布したかぼちやの花粉及び花蜜を分析試料とした花粉・花蜜残留試験の結果を表 9 に示す。試験における最大値は花粉及び花蜜でそれぞれ 2.99 及び 0.03 mg/kg であった。

表 9：開花初期に散布したかぼちやの花粉・花蜜残留試験結果（資料 9、2022 年）下線：試験における最大値

作物名 (品種) (栽培形態)	試験場所 実施年度	試験条件			分析 部位	使用 時期	経過 日数* (日)	残留濃度(mg/kg)	
		剤型	使用 方法	ha当たりの 有効成分投下量 (kg ai/ha)				ジノテフラン	
								測定値	
								花粉	花蜜
かぼちゃ (えびす) (施設)	日本 (茨城県) 2021年	20.0 % 水溶剤	散布 2000倍希釈 300 L/10 a	0.30	花粉** または 花蜜***	開花 初期	0	1.14	<0.01
							1	0.06	0.03
							3	0.06	0.03
							7	0.02	0.01
							14	0.03	<0.01
	日本 (高知県) 2021年						0	1.10	<0.01
							1	<0.01	0.02
							3	0.01	0.02
							7	0.04	0.01
							14	0.03	<0.01
	日本 (宮崎県) 2021年						0	2.99	<0.01
							1	0.02	0.01
							3	0.04	0.02
							7	0.03	<0.01
							14	0.02	<0.01

*処理（散布）からの経過日数 **スパーテルを用いて葯から掻き取り採取 ***パスツールピペットを用いて採取

(2) 試験 2

開花7日前にジノテフランを散布したかぼちゃの花粉及び花蜜を分析試料とした花粉・花蜜残留試験の結果を表10に示す。
散布 21 日後における最大値は花粉及び花蜜でそれぞれ 0.02 及び<0.01 mg/kg であった。

表 10：開花 7 日前に散布したかぼちゃの花粉・花蜜残留試験結果（資料 9、2022 年）下線：試験における最大値

作物名 (品種) (栽培形態)	試験場所 実施年度	試験条件			分析 部位	使用 時期	経過 日数* (日)	残留濃度(mg/kg)	
		剤型	使用 方法	ha当た りの有 効成分 投下量 (kg ai/ha)				ジノテフラン	
								測定値	
								花粉	花蜜
かぼちゃ (えびす) (施設)	日本 (茨城県) 2021年	20.0 % 水溶剤	散布 2000倍 希釈 300 L/10 a	0.30	花粉** または 花蜜***	開花 7日前	7	0.14	0.05
							8	0.12	0.03
							10	0.06	0.01
							14	0.05	<0.01
							21	0.02	<0.01
	日本 (高知県) 2021年						7	0.12	0.04
							8	0.11	0.03
							10	0.07	0.01
							14	0.05	<0.01
							21	0.01	<0.01
	日本 (宮城県) 2021年						7	0.10	0.03
							8	0.11	0.02
							10	0.11	0.01
							14	0.04	<0.01
							21	0.01	<0.01

*処理（散布）からの経過日数 **スパーテルを用いて葯から掻き取り採取 ***パスツールピペットを用いて採取

3.2 土壌処理シナリオ

(1) 試験 1 及び試験 2

育苗期にジノテフランを処理した水稻の花粉を分析試料とした花粉残留試験の結果を表 11 に示す。最大値は 0.12 mg/kg であった。

表 11：水稻の花粉残留試験結果（資料 6 及び 7、2020 及び 2021 年）下線：試験における最大値

作物名 (品種) (栽培形態)	試験場所 実施年度	試験条件			分析 部位	使用 時期	経過 日数* (日)	残留濃度(mg/kg)
		剤型	使用 方法	ha当たりの 有効成分投下量 (kg ai/ha)				ジノテフラン
								測定値
水稲 (コシヒカリ) (露地)	日本 (長野県) 2019年	12.0 % 粒剤	育苗箱処理 50 g/育苗箱 (20箱/10 a)	1.2	花粉**	移植 当日	73	0.02
							74	0.02
							77	0.02
							81	0.02
	日本 (茨城県) 2020年						77	0.04
							78	0.02
							80	0.03
							82	0.05
	日本 (高知県) 2020年						72	0.03
							73	0.02
							75	0.04
							77	0.04
	日本 (宮崎県) 2020年						71	0.05
							72	<u>0.12</u>
							74	0.09
							78	0.06

*処理（育苗箱処理）からの経過日数

**長野県の試験はパラフィン紙を裏打ちした袋に振り落として採取。その他の試験は稲花粉採取機（充電式クリーナー）を用いて穂から吸引し、フィルターに捕集した花粉

(2) 試験 3

定植時にジノテフランを土壌処理したかぼちゃの花粉及び花蜜を分析試料とした花粉・花蜜残留試験の結果を表 12 に示す。試験ごとの最大値の中の最大は花粉及び花蜜でそれぞれ 0.07 及び 0.02 mg/kg であった。また、試験ごとの平均値の中の最大は花粉及び花蜜でそれぞれ 0.04 及び 0.01 mg/kg であった。

表 12：かぼちゃの花粉・花蜜残留試験結果（資料 8、2022 年）下線：試験における最大値

作物名 (品種) (栽培形態)	試験場所 実施年度	試験条件			分析 部位	使用 時期	経過 日数* (日)	残留濃度(mg/kg)			
		剤型	使用 方法	ha当たりの 有効成分投下量 (kg ai/ha)				ジノテフラン			
								花粉		花蜜	
								測定値	平均値 *****	測定値	平均値 *****
かぼちゃ (えびす) (施設)	日本 (茨城県) 2021年	1.0 % 粒剤	植穴 土壌 混和 (2 g/株)	0.076**	花粉*** または 花蜜*****	定植 当日	26	0.07	0.04	0.02	0.01
	27						0.06	0.01			
	29						0.03	0.01			
	33						0.02	<0.01			
	40						0.02	<0.01			
	26						0.04	0.03	<0.01	0.01	
	27						0.03		<0.01		
	29						0.02		<0.01		
	33						0.02		<0.01		
	40						0.01		<0.01		
	26						0.02	0.02	<0.01	0.01	
	27						0.02		<0.01		
	29						0.01		<0.01		
	33						0.02		<0.01		
	40						0.01		<0.01		

*処理（植穴土壌混和）からの経過日数 **株数：3800 本/ha で算出 ***スパーテルを用いて葯から掻き取り採取 ****パスツールピペットを用いて採取

*****経過日数 26～33 日の測定値の幾何平均値、定量限界未満 (<0.01 mg/kg) の値は、0.01 mg/kg として計算

3.3 種子処理シナリオ

該当なし

4. 蜂群への影響試験

(1) トンネル試験 1

セイヨウミツバチの蜂群を用いたトンネル試験が実施され、ジノテフランを 1.2 kg ai/ha の投下量で稲の育苗期に処した後、0.15 kg ai/ha の投下量(散布濃度:0.075 ai %) で出穂期に散布してミツバチに暴露させた結果、いずれの試験においても成虫の死虫数及び蜂群強度(蜂量)への影響は認められなかった。

表 13：トンネル試験 1 の結果(資料 10、2020 年)

被験物質	ジノテフラン12 %粒剤(土壌処理)及びジノテフラン10 %液剤(散布)
供試生物/反復	試験実施機関で飼育しているセイヨウミツバチ(<i>Apis mellifera ligustica</i>)蜂群/4反復(陽性対照区は2反復)、約8,000 頭/群
準拠ガイドライン	OEPP/EPPO Guideline No. 170(4), 2010
試験場所	米国カリフォルニア州
試験期間	2019年8~10月 (8月19日に巣箱をトンネル内に設置、8月21日に被験物質を散布、1週間トンネル内で暴露、処理8日後に巣箱を2.8 km離れた場所(野外)に移動し、散布51日後まで飼育)
試験区の規模	トンネル面積：186 m ² (6.1 m×30.5 m)、断面が半円形の合成ガーゼ(メッシュサイズ約1.5 mm)で覆われたトンネル、高さは2.8 m 稲栽培面積：約110 m ²
処理方法(液量)	陰性対照区：水道水(200 L/ha)を散布 陽性対照区：ジメトエート(400 g ai/ha, 200 L/ha)を散布 被験物質処理区：(土壌処理)ジノテフラン12 %粒剤を1.2 kg ai/haで6月18日(育苗期, BBCH 13)に処理、(散布)ジノテフラン10 %液剤の希釈溶液(0.075 ai %)(200 L/ha)で8月21日(出穂期, BBCH 61-65)に散布
処理量(散布濃度)	土壌処理：1.2 kg ai/ha、散布：0.15 kg ai/ha(0.075 ai %)
試験作物 (処理/散布時のBBCH)	稲(<i>Oryza sativa</i> 、品種 M-104)(土壌処理：BBCH13、散布：BBCH61-65)
観察項目	訪花虫数、死虫数及び蜂群強度(蜂量)
観察及び測定	- 訪花虫数：1 m²の区画(3区画)に採餌に来たミツバチの数を約1分間計測 - 死虫数：散布28日後まで毎日測定(死虫トラップ中の死虫を計測) - 蜂群強度(蜂量)：散布3日前、散布7、15、22、31、37、44及び51日後に巣箱から巣板を取り出し、巣の状態を確認。巣板一面あたり100 %成虫が占有している状況を1,118頭と仮定し推算

散布日の訪花虫密度	<table><tr><th>項目</th><th>調査段階*(日)</th><th>陰性対照区</th><th>散布区</th><th>陽性対照区</th></tr><tr><td rowspan="2">訪花虫密度(頭/m²/min)</td><td>0</td><td>3.8±3.2</td><td>1.8±0.6</td><td>0.1±0.0</td></tr><tr><td>0~7</td><td>4.7±2.8</td><td>1.8[#]±0.4</td><td>0.1^{##}±0.0</td></tr></table> *散布日を0(日)とした調査日 [#]陰性対照区と散布区を比較して有意差あり(Dunnett t-test、p<0.05) ^{##}陰性対照区と陽性対照区を比較して有意差あり(pooled t-test、p<0.05)	項目	調査段階*(日)	陰性対照区	散布区	陽性対照区	訪花虫密度(頭/m ² /min)	0	3.8±3.2	1.8±0.6	0.1±0.0	0~7	4.7±2.8	1.8 [#] ±0.4	0.1 ^{##} ±0.0																											
項目	調査段階*(日)	陰性対照区	散布区	陽性対照区																																						
訪花虫密度(頭/m ² /min)	0	3.8±3.2	1.8±0.6	0.1±0.0																																						
	0~7	4.7±2.8	1.8 [#] ±0.4	0.1 ^{##} ±0.0																																						
死虫数(①) 及び 蜂群強度(蜂量)(②) の推移	①死虫数 - トンネル内において陰性対照区と処理区の上に統計的な有意な差あり - 巣箱設置時の蜂群強度（8,000頭と仮定）から算出した死虫率は10 % 以下(1.8±0.82 %)であった。 <table><tr><th rowspan="2">調査段階* (日)</th><th colspan="3">死虫数（頭）</th></tr><tr><th>陰性対照区</th><th>散布区</th><th>陽性対照区</th></tr><tr><td>-2~0 (暴露前)</td><td>4.3±3.8</td><td>24±19</td><td>1.2±0.2</td></tr><tr><td>0~7 (トンネル内)</td><td>2.1±0.4</td><td>140[#]±65</td><td>120[#]±6.7</td></tr><tr><td>8~28 (トンネル外)</td><td>14±15</td><td>6.5±3.6</td><td>10±1.9</td></tr></table> *散布日を0(日)とした調査日 [#]陰性対照区と比較して有意差あり(Dunnett t-test、p<0.05)				調査段階* (日)	死虫数（頭）			陰性対照区	散布区	陽性対照区	-2~0 (暴露前)	4.3±3.8	24±19	1.2±0.2	0~7 (トンネル内)	2.1±0.4	140 [#] ±65	120 [#] ±6.7	8~28 (トンネル外)	14±15	6.5±3.6	10±1.9																			
	調査段階* (日)	死虫数（頭）																																								
		陰性対照区	散布区	陽性対照区																																						
-2~0 (暴露前)	4.3±3.8	24±19	1.2±0.2																																							
0~7 (トンネル内)	2.1±0.4	140 [#] ±65	120 [#] ±6.7																																							
8~28 (トンネル外)	14±15	6.5±3.6	10±1.9																																							
②蜂群強度(蜂量) 陰性対照区と散布区の上に統計的な有意な差なし <table><tr><th rowspan="2">調査段階* (日)</th><th colspan="3">蜂群強度(蜂量)(頭)</th></tr><tr><th>陰性対照区</th><th>散布区</th><th>陽性対照区</th></tr><tr><td>-3***</td><td>8,100±1,900</td><td>7,900±2,400</td><td>8,000±1,100</td></tr><tr><td>7**</td><td>7,900±2,200</td><td>3,900±2,600</td><td>3,400±400</td></tr><tr><td>15***</td><td>5,700±1,400</td><td>4,900±3,400</td><td>3,200[#]±280</td></tr><tr><td>22***</td><td>4,800±870</td><td>4,100±2,200</td><td>2,800[#]±240</td></tr><tr><td>31***</td><td>5,500±1,600</td><td>5,100±2,600</td><td>3,000±280</td></tr><tr><td>37***</td><td>6,800±1,200</td><td>5,200±2,900</td><td>4,100[#]±870</td></tr><tr><td>44***</td><td>7,700±1,100</td><td>6,200±3,500</td><td>5,300±2,900</td></tr><tr><td>51***</td><td>6,300±1,600</td><td>5,500±3,300</td><td>4,600±2,100</td></tr></table> *散布日を0(日)とした調査日 **トンネル内 ***トンネル外 [#]陰性対照区と比較して有意差あり(Student's t-test、p<0.05)				調査段階* (日)	蜂群強度(蜂量)(頭)			陰性対照区	散布区	陽性対照区	-3***	8,100±1,900	7,900±2,400	8,000±1,100	7**	7,900±2,200	3,900±2,600	3,400±400	15***	5,700±1,400	4,900±3,400	3,200 [#] ±280	22***	4,800±870	4,100±2,200	2,800 [#] ±240	31***	5,500±1,600	5,100±2,600	3,000±280	37***	6,800±1,200	5,200±2,900	4,100 [#] ±870	44***	7,700±1,100	6,200±3,500	5,300±2,900	51***	6,300±1,600	5,500±3,300	4,600±2,100
調査段階* (日)	蜂群強度(蜂量)(頭)																																									
	陰性対照区	散布区	陽性対照区																																							
-3***	8,100±1,900	7,900±2,400	8,000±1,100																																							
7**	7,900±2,200	3,900±2,600	3,400±400																																							
15***	5,700±1,400	4,900±3,400	3,200 [#] ±280																																							
22***	4,800±870	4,100±2,200	2,800 [#] ±240																																							
31***	5,500±1,600	5,100±2,600	3,000±280																																							
37***	6,800±1,200	5,200±2,900	4,100 [#] ±870																																							
44***	7,700±1,100	6,200±3,500	5,300±2,900																																							
51***	6,300±1,600	5,500±3,300	4,600±2,100																																							

(2) トンネル試験 2

セイヨウミツバチの蜂群を用いたトンネル試験が実施され、ジノテフランを 1.2 kg ai/ha の投下量で稲の育苗期に処した後、0.10 kg ai/ha の投下量（散布濃度：1.25 ai %）で出穂期に散布してミツバチに暴露させた結果、いずれの試験においても成虫の死虫数及び蜂群強度（蜂量）への影響は認められなかった。

表 14：半野外試験 2（トンネル試験）の設計（資料 11、2021 年）

被験物質	ジノテフラン12 %粒剤(土壌処理)及びジノテフラン10 %液剤(散布)
供試生物/反復	試験実施機関で飼育しているセイヨウミツバチ(<i>Apis mellifera ligustica</i>)蜂群/4反復(陽性対照区は2反復)、約9,000 頭/群
準拠ガイドライン	OEPP/EPPO Guideline No. 170(4), 2010
試験場所	トンネル内：米国ジョージア州 トンネル外：米国ノースカロライナ州
試験期間	2020年8~10月 (8月18日に巣箱をトンネル内に設置、8月21日に被験物質を散布、1週間トンネル内で暴露、処理8日後に巣箱を548 km離れた場所(野外)に移動し、散布48日後まで飼育)
試験区の規模	トンネル面積：186 m ² (6.1 m×30.5 m)、断面が半円形の合成ガーゼ(メッシュサイズ約1.5 mm)で覆われたトンネル、高さは2.8 m 稲栽培面積：約110 m ²
処理方法(液量)	陰性対照区：水道水(200 L/ha)を散布 陽性対照区：ジメトエート(400 g ai/ha, 200 L/ha)を散布 被験物質処理区：(土壌処理)ジノテフラン12 %粒剤を1.2 kg ai/haで6月17日(育苗期, BBCH 13)に処理、(散布) ジノテフラン10 %液剤の希釈溶液(1.25 ai %)(8 L/ha)で8月21日(出穂期, BBCH 61-64)に散布
処理量(散布濃度)	土壌処理：1.2 kg ai/ha、散布：0.10 kg ai/ha(1.25 ai %)
試験作物 (処理/散布時のBBCH)	稲(<i>Oryza sativa</i> 、品種 Titan)(土壌処理：BBCH13、散布：BBCH61-64)
観察項目	訪花虫数、死虫数及び蜂群強度(蜂量)
観察及び測定	- 訪花虫数：1 m²の区画(3区画)に採餌に来たミツバチの数を約1分間計測 - 死虫数：散布28日後まで毎日測定(死虫トラップ中の死虫を計測) - 蜂群強度(蜂量)：散布4日前、散布6、14、20、28、34、41及び48日後に巣箱から巣板を取り出し、巣の状態を確認。巣板一面あたり100 %成虫が占有している状況を1,118頭と仮定し推算

散布日の訪花虫密度					
	項目	調査段階*(日)	陰性対照区	散布区	陽性対照区
	訪花虫密度(頭/m ² /min)	0 0~7	0.6±0.2 1.3±0.5	1.5±1.0 2.0±1.5	0.1 [#] ±0.1 0.1 [#] ±0.1
*散布日を0(日)とした調査日 [#] 陰性対照区と比較して有意差あり(pooled t-test、p<0.05)					
死虫数(①) 及び 蜂群強度(蜂量)(②) の推移	①死虫数 ・陰性対照区と処理区間に統計的な有意な差なし				
	調査段階* (日)	死虫数(頭)			
		陰性対照区	散布区	陽性対照区	
	-3~0 (暴露前)	7.8±3.1	10±4.6	24±19	
	0~7 (トンネル内)	3.2±1.8	11±9.6	33 [#] ±1.6	
	8~28 (トンネル外)	14±7.8	11±3.2	20±5.5	
	*散布日を0(日)とした調査日 [#] 陰性対照区と比較して有意差あり(pooled t-test、p<0.05)				
	②蜂群強度(蜂量) 陰性対照区と散布区間に統計的な有意な差なし				
	調査段階* (日)	蜂群強度(蜂量)(頭)			
		陰性対照区	散布区	陽性対照区	
	-4***	8,300±2,800	9,100±1,700	11,000±2,200	
	6**	9,400±3,300	7,300±1,200	8,300±630	
	14***	10,000±3,900	7,700±3,000	7,200±4,600	
	20***	8,500±3,400	7,100±2,000	6,300±3,600	
	28***	6,400±3,000	5,700±1,000	5,100±2,300	
	34***	7,400±4,200	6,900±1,700	5,100±2,800	
	41***	5,900±4,200	6,900±2,800	5,400±3,800	
	48***	5,600±4,500	4,800±2,100	4,300±3,900	
*散布日を0(日)とした調査日 **トンネル内 ***トンネル外					

III. 毒性指標

1. 毒性試験の結果概要

毒性試験の結果概要を表 15 に示す。

表 15：各試験の毒性値一覧

毒性試験	毒性値			
	エントポイント	試験1	試験2	文献1
成虫 単回接触毒性	48 h LD ₅₀ (μg ai/bee)	0.107	0.056	0.041
成虫 単回経口毒性		0.0137	—*	
成虫 反復経口毒性	10 d LDD ₅₀ (μg ai/bee/day)	0.010		
幼虫 経口毒性	72 h LD ₅₀ (μg ai/bee)	>3.3		

*対照区の死亡率がガイドラインで示された要件を満たしていないことから参考資料とした。

2. 毒性指標値

成虫単回接触毒性については、試験 1 の 48h LD₅₀ 値 (0.107 μg ai/bee)、試験 2 の 48h LD₅₀ 値 (0.056 μg ai/bee) 及び文献 1 の 48h LD₅₀ 値 (0.041 μg ai/bee) の幾何平均値 0.0626 μg ai/bee を採用し、毒性指標値を 0.062 μg ai/bee とした。

成虫単回経口毒性については、試験 1 の 48h LD₅₀ 値 (0.0137 μg ai/bee) を採用し、毒性指標値を 0.013 μg ai/bee とした。

成虫反復経口毒性については、試験 1 の 10d LDD₅₀ 値 (0.010 μg ai/bee/day) を採用し、毒性指標値を 0.010 μg ai/bee/day とした。

幼虫経口毒性については、試験 1 の 72 h LD₅₀ 値 (>3.3 μg ai/bee) を採用し、毒性指標値を 3.3 μg ai/bee とした。

ジノテフランのミツバチへの影響評価に用いる毒性指標値を表 16 に示す。

表 16：ジノテフランのミツバチへの影響評価に用いる毒性指標値

生育段階	毒性試験の種類	毒性指標値(単位)	
成虫	単回接触毒性	48 h LD ₅₀ (μg ai/bee)	0.062
	単回経口毒性		0.013
	反復経口毒性	10 d LDD ₅₀ (μg ai/bee/day)	0.010
幼虫	経口毒性	72 h LD ₅₀ (μg ai/bee)	3.3

3. 毒性の強さから付される注意事項

成虫単回接触毒性及び成虫単回経口毒性共に LD₅₀ は 11 μg/bee 未満であったため、注意事項を要する。

IV. 暴露量の推計及び暴露ごとのリスク評価結果

1. ミツバチが暴露しないと想定される適用

ジノテフランを含有する各種製剤の適用のうち、1.1~1.3 に示す適用については、その使用にあたり本剤にミツバチが暴露しないと想定されるため、暴露量の推計は行わなかった。

1.1 エアゾル剤等、一度に広範囲かつ多量に使用されることがない製剤

ジノテフランを含有する各種製剤の適用のうち、表 17 に示す製剤が該当。

表 17：ジノテフランを含有するエアゾル剤等、一度に広範囲かつ多量に使用されることがないと考えられる製剤

整理番号*	登録番号	製剤名	農薬の種類
43	23372	スターガードプラスAL	ジノテフラン0.010 %・ペンチオラト0.010 %水和剤
45	23506	オールスタープレー	ジノテフラン0.010 %液剤
52	24316	アースガードン4	エトフェンプロックス0.020 %・ジノテフラン0.010 %・ミルベメクチン0.00050 %・ペンチオラト0.010 %水和剤

*別添 1 及び 3 における整理番号

1.2 適用場所が「温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所」に限られている適用

該当なし

1.3 ミツバチが暴露しないと想定される作物

(1) 開花前に収穫する作物

- 1) あぶらな科 かぶ、キャベツ¹、クレソン、だいこん、チンゲンサイ²、はくさい¹、ブロッコリー³、畑わさび²、非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)、非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイ、畑わさびを除く)

¹結球あぶらな科葉菜類、²非結球あぶらな科葉菜類、³はなやさい類

- 2) きく科 しゅんぎく、すいぜんじな、ふき、レタス¹、非結球レタス¹、葉ごぼう

¹レタス類

- 3) ひがんばんな科 たまねぎ¹、にら²、ねぎ²、らっきょう¹、わけぎ²

¹鱗茎類(根物)、²鱗茎類(葉物)

- 4) ゆり科 該当なし

- 5) せり科 せり、せり(水耕栽培)、セリ、にんじん、みつば

- 6) ヒユ科 てんさい、ほうれんそう¹

¹ヒユ科葉菜類

- 7) しょうが科 しょうが

- 8) その他の作物 モロヘヤ

(2) 開花しない作物 (栽培管理により開花しない作物を含む)

- 1) シダ植物 該当なし

- 2) 芝 該当なし

- 3) その他 かんしょ、くわい、茶

(3) 夜間に開花する作物

該当なし

(4) ミツバチが訪花しないとの知見のある開花作物

さとうきび、小麦

2. ミツバチが暴露する可能性がある適用

2.1 リスク管理措置（被害防止方法）を課す適用

2.1.1 リスク管理措置を課すことで暴露しないと評価した適用

以下の（1）～（9）のリスク管理措置を課す適用については、ミツバチへの暴露を防ぐことができるため、暴露量の推計を行わなかった。

（1）閉鎖系施設栽培での使用に限る

散布：きく、きゅうり(花)、しそ(花穂)、食用エキゾカム、食用カーネーション、食用ぎく、食用コスモス、食用せんにちこう、食用トレニア、食用なでしこ、食用パンジー、食用プリムラ、食用ミニバラ、食用金魚草

定植時の植穴土壌混和：いちご、ガーベラ、きく、食用ぎく

生育期の株元散布：ガーベラ、きく、きゅうり、ズッキーニ、ピーマン、食用ぎく

灌注：きく

（2）閉鎖系施設栽培での使用または発芽（萌芽）～落花（開花終了）までを除く期間の使用に限る

散布：あけび(果実)、うめ、おうとう、オリーブ、オリーブ(葉)、かき、かんきつ、サザンカ、なし、なんてん(葉)、ネクター、びわ、ぶどう、マンゴー、もも、ラズベリー、りんご、小粒核果類

無人航空機による散布*：かき

*「閉鎖系施設栽培での使用」の記載は不要

本剤1 g当り水1 mLの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いだ部分に塗布する：かき、ぶどう

樹幹注入**：アメリカワ、ガジュマル、くすのき、さくら、つばき類、デイゴ、ひのき、ぶな、ブラタス、樹木類(つばき類を除く)

**「閉鎖系施設栽培での使用」の記載は不要

（3）閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る

散布：あずき、アスパラガス、アマランサス(茎葉)、いぐさ、うり類(漬物用)、えごま(種子)、えだまめ、オクラ、かぼちゃ、きゅうり、きゅうり(葉)、さやいんげん、さやえんどう、しよくようほおずき、すいか、ズッキーニ、だいず、とうがらし(葉)、とうがらし類、とうもろこし(子実)、トマト、なす、にがうり、ばれいしょ、ピーマン、まくわうり、ミニトマト、メロン、実えんどう、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげ、未成熟そらまめを除く)、未成熟ささげ、未成熟そらまめ、未成熟とうもろこし

無人航空機による散布：えだまめ、だいず

空中散布*：えだまめ、だいず

播溝土壌混和：えだまめ、だいず

株元散布：オクラ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、とうがらし類**

*「閉鎖系施設栽培での使用」の記載は不要

**使用時期「生育期」

（4）閉鎖系施設栽培以外では、開花している場合は摘花してから使用し、使用後は開花期終了まで摘花する

株元散布：かんきつ(苗木)、なし(苗木)

株元灌注：かんきつ(苗木)

- (5) 閉鎖系施設栽培以外で使用する場合、開花させない

散布：しそ、バジル

植穴土壌混和：しそ

- (6) 開花前に収穫する作物以外は、閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る

散布：花き類・観葉植物(きくを除く)

株元散布：花き類・観葉植物、花き類・観葉植物(きく、ガーベラを除く)

灌注：花き類・観葉植物、花き類・観葉植物(きくを除く)

植穴土壌混和：花き類・観葉植物(きく、ガーベラを除く)

- (7) 「閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」または「発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」

散布：つつじ類、つばき類、樹木類(つつじ類、つばき類を除く)

株元散布：つつじ類

株元灌注：つばき類

- (8) 閉鎖系施設栽培以外で使用する場合、えごま(葉)については、開花させない、それ以外の作物については、発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る

散布：しそ科葉菜類(しそ、バジルを除く)

- (9) 開花期終了後の使用に限る

原液の空中散布：稲*

*ホクコーラブサイドスタークルフロアブル

- (10) 開花している場合は摘花してから使用し、使用後は開花期終了まで摘花する

散布：わさび*

*わさび用緑風SG

株元灌注：そてつ

2.1.2 暴露を低減するリスク管理措置を課す適用

以下の(1)または(2)のリスク管理措置を課す適用については、ミツバチへの暴露を低減するリスク管理措置を課した条件で暴露量の推計を行った。

暴露量の推計の詳細については、2.2の該当するシナリオにおいて記載した。

なお、「閉鎖系施設栽培」での使用の場合はミツバチへの暴露が防がれるため暴露量の推計を行わなかった。

(3)のリスク管理措置を課す適用については、ミツバチへの暴露を低減するリスク管理措置を課した条件で第2段階評価を行った。

第2段階評価の詳細については、2.3 に記載した。

- (1) 1.1 kg/10 a を超える場合は、閉鎖系施設栽培での使用に限る
育苗期の株元散布：きゅうり（2 g/株）、とうがらし類、メロン（2 g/株）、ピーマン
定植時の植穴土壌混和：きゅうり（2 g/株）、とうがらし（葉）、とうがらし類、
メロン（2 g/株）、ズッキーニ、ピーマン、
- (2) 5.5 kg/10 a を超える場合は、閉鎖系施設栽培での使用に限る
定植時の植穴土壌混和：ピーマン（5 g/株）
- (3) 150 L/10 a を超えて使用した場合は、開花前に収穫する
いね科牧草

2.2 第1段階評価

ミツバチが暴露する可能性がある適用のうち、2.1.1 に掲げるリスク管理措置を課すことで暴露評価を不要とした適用以外については、茎葉散布、土壌処理、種子処理のいずれかのシナリオの下、第1段階評価の対象とした。

第1段階評価は、蜂群を構成する個々のミツバチへの影響を、実験室で実施された毒性試験の結果に基づき把握し、ミツバチの死亡率が蜂群への影響が懸念される水準とならないかを評価するものである。室内での毒性試験における対照群の自然死亡率を10%まで許容していることに鑑み、ミツバチの死亡率が10%を超えなければ、蜂群への影響がないものとする。

しかしながら、ミツバチの死亡率が被験物質処理群と対照群でほぼ同じとなる処理量を試験から正確に求めるのは困難である。一方、米国で過去に実施された試験の解析により、死亡率が10%となる処理量の半数致死量（LD₅₀：ミツバチの死亡率が50%となる処理量）に対する比の平均が0.4であったとの知見がある*ことから、ミツバチの推計暴露量の半数致死量に対する比率、RQ（リスク比）の概念を導入し、RQが0.4を超えない場合には、農薬への暴露によるミツバチの死亡率は10%を超えず、蜂群への影響がないものと評価する。

*U.S.EPA（2014）, Guidance for Assessing Pesticide Risks to Bees p.32

2.2.1 茎葉散布シナリオ

2.2.1.1 スクリーニング# #：予測式を用いた推計暴露量による評価

2.2.1.1.1 暴露量の推計（スクリーニング）

「農薬のミツバチへの影響評価ガイダンス」に準拠して、表18のパラメータを用いて、茎葉散布シナリオの予測式により暴露量の推計を行った。

表 18：暴露量推計に関するパラメーター（農薬付着量、摂餌量及び農薬残留量）

接触暴露			
農薬付着量(nL/bee)			70
経口暴露			
摂餌量(mg/bee/day)	成虫	花粉	9.6
		花蜜	140
	幼虫	花粉	3.6
		花蜜	120
農薬残留量(μg/g per kg/ha)	花粉・花蜜		98

2.2.1.1.2 リスク評価結果（スクリーニング）

茎葉散布シナリオのスクリーニングを行った、わさびの使用時期「畑育苗期」、使用方法「散布」の適用において、成虫単回経口暴露、成虫反復経口暴露及び幼虫経口暴露の RQ が 0.4 を超えたため、提出のあった花粉・花蜜残留試験を用いて精緻化を実施した。

また、稲の使用方法「散布、無人航空機*による散布及び空中散布」の適用並びにいね科牧草の使用方法「散布」の適用において、成虫単回接触暴露、成虫単回経口暴露または成虫反復経口暴露のいずれかの RQ が 0.4 を超えたため、提出のあった蜂群への影響試験を用いて第 2 段階評価を実施した。

*無人ヘリコプターを含む。これ以降同様。

2.2.1.1.2 精緻化^{##} ^{##}：花粉・花蜜残留試験等、実測値を用いた推計暴露量による評価

2.2.1.1.2.1 暴露量の推計（精緻化）

表 19 に示す適用について、実測値を用いた推計暴露量の精緻化を実施した。

表 19：精緻化を実施した適用

整理番号*	登録番号	製剤名	作物名(使用時期/使用方法)
3	20811	スタークル顆粒水溶剤	わさび(畑育苗期/散布)
	20812	アルバリン顆粒水溶剤	
	20813	ホクコースタークル顆粒水溶剤	
	20961	三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	

* 別添 1 及び 3 における整理番号

わさびは畑育苗期に開花することではなく、本田に定植後、開花までには 4 か月程度の間隔がある。

このため、畑育苗期に農薬を散布した場合、農薬散布から開花までには、少なくとも 4 か月程度の期間がある。

わさびは栽培体系が特殊であることから、わさびを試験作物とした花粉・花蜜

残留試験の実施は困難である。一方、同じ草本作物であり、花粉・花蜜残留試験の実施が比較的容易な作物として、かぼちゃが広く用いられている。かぼちゃは、草本作物において開花前に散布された農薬が、その後に開花する花の花粉または花蜜中に移行・残留する挙動を推定する上で、一定の代表性を有すると考えられる。

そのため、かぼちゃとわさびは異なる科に属する作物ではあるものの、本評価では、かぼちゃを代表作物として、開花前に農薬を散布した花粉・花蜜残留試験（資料 9）の結果を基に、わさびにおける推計暴露量の精緻化を行った。

畑育苗期のわさびへの農薬散布から開花までの期間は 4 か月程度であり、かぼちゃの花粉・花蜜残留試験における散布後最長日数の測定時点（散布 21 日後）よりも十分に長いことから、当該試験結果を精緻化に用いることが可能であると判断した。

当該試験における花粉中及び花蜜中のジノテフラン残留濃度の推移を、それぞれ図 1 及び図 2 に示した。




図 1： かぼちゃの開花 7 日前にジノテフランを散布した後の花粉中の残留濃度の推移




図 2： かぼちゃの開花 7 日前にジノテフランを散布した後の花蜜中の残留濃度の推移

かぼちゃの花蜜中におけるジノテフランの残留濃度は、茎葉散布後 7~10 日前後において概ね 0.06~0.14 mg/kg と比較的高い値を示した。その後はいずれの試験区においても経時的に低下する傾向が認められ、散布 14 日後では 0.04~0.05 mg/kg 程度まで減少した。さらに散布 21 日後には 0.01~0.02 mg/kg 程度まで低下し、初期と比べて明確な減衰が確認された。試験区間で残留濃度の水準には一定のばらつきがみられるものの、散布後の時間経過に伴い花粉中のジノテフラン残留濃度が低下する傾向は、いずれの試験区においてもおおむね共通していた。

かぼちゃの花蜜中におけるジノテフランの残留濃度は、茎葉散布後 7~8 日前後において 0.02~0.05 mg/kg を示した。その後はいずれの試験区においても速やかに低下し、散布 10 日後には概ね 0.01 mg/kg 程度まで減少した。散布 14 日後以降は 0.01 mg/kg 前後で推移しており、明確な上昇傾向は認められなかった。試験区間で初期濃度には一定のばらつきがみられるものの、時間の経過に伴い花蜜中の残留濃度が低下し、比較的低い水準で安定する傾向は、いずれの試験区においてもおおむね共通していた。

精緻化における単回経口暴露及び反復経口暴露共にはかぼちゃの試験における散布 21 日後の最大の残留値を用いて暴露量を推計した。なお、定量限界未満 (<0.01 mg/kg) の値は、0.01 mg/kg として計算した。

推計に用いた残留値を表 20 に示した。

表 20：精緻化における暴露量の推計に用いた残留値

単回経口評価(散布21日後の花粉最大値)	0.02 mg/kg (処理量0.30 kg ai/ha)
反復経口評価(散布21日後の花粉最大値)	
単回経口評価(散布21日後の花蜜最大値)	0.01 mg/kg (処理量0.30 kg ai/ha)
反復経口評価(散布21日後の花蜜最大値)	

2.2.1.2.2 リスク評価結果（精緻化）

精緻化を行うことにより、表 18 に示す適用について RQ が 0.4 以下となったため、蜂群への影響は懸念されないと評価結果となった（別添 3 及び表 21）。

表 21：精緻化を実施したわさびの適用の RQ（上段：スクリーニング、下段：精緻化）

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	花粉・花蜜残留濃度				推計暴露量 (µg/bee)			RQ 推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法
								最大値 (µg/g)		平均値 (µg/g)		成虫/単回 成虫/反復 幼虫			成虫/単回 成虫/反復 幼虫			
								花粉	花蜜	花粉	花蜜							
わさび	アブラムシ類等	2000	300 L/10	畑育苗期	散布	茎葉 散布	0.30	29				4.4		3.6	340	440	1.1	不要
								0.02	0.01	0.02	0.01	0.0016	0.0016	0.0013	0.12	0.16	0.00039	

2.2.2 土壌処理シナリオ

2.2.2.1 スクリーニング[#]

[#]：予測式を用いた推計暴露量による評価

2.2.2.1.1 暴露量の推計（スクリーニング）

「農薬のミツバチへの影響評価ガイドンス」に準拠して、表 22 のパラメーターを用いて、土壌処理シナリオの予測式により暴露量の推計を行ったところ、別添 3 のとおりの結果となった。

表 22：暴露量推計に関するパラメーター

（摂餌量、農薬残留量、log Pow、土壌吸着係数）

経口暴露			
摂餌量(mg/bee/day)	成虫	花粉	9.6
		花蜜	140
	幼虫	花粉	3.6
		花蜜	120
農薬残留量(μg/g per kg/ha)		花粉・花蜜	0.287
1-オクタノール/水分配係数(log P _{ow})			-0.549
土壌吸着係数(K ^{ads} _{Foc})(6種類の土壌の中央値)			42

2.2.2.1.2 リスク評価結果（スクリーニング）

うり類（漬物用）、きゅうり、ズッキーニ、とうがらし（葉）、とうがらし類、ピーマン及びメロン（2 g/株）の土壌処理の適用において成虫単回経口暴露または成虫反復経口暴露のいずれかの RQ が 0.4 を超えたため、提出のあった花粉・花蜜残留試験を用いて精緻化を実施した。スクリーニングを実施したその他の土壌処理の適用（いぐさ、稲、稲（箱育苗）、かぼちゃ、すいか、トマト、なす、にがうり、ミニトマト及びメロン（1 g/株））については、RQ が 0.4 を超えないことを確認した（別添 3）。

2.2.2.2 精緻化^{##}

^{##}：花粉・花蜜残留試験等、実測値を用いた推計暴露量による評価

2.2.2.2.1 暴露量の推計（精緻化）

表 23 に示す適用について、実測値を用いた推計暴露量の精緻化を実施した。

表 23：精緻化を実施した適用

整理番号*	登録番号	製剤名	作物名(使用時期/使用方法)
1	20805	スタークル粒剤	①きゅうり、メロン(2 g/株)、ピーマン及びとうがらし類(育苗期/株元散布)
	20806	アルバリン粒剤	
	20807	ホクコースタークル粒剤	②きゅうり、うり類(漬物用)、メロン(2 g/株)、ズッキーニ、ピーマン、とうがらし類及びとうがらし(葉)(定植時/植穴土壌混和)
	20959	三井東圧アルバリン粒剤	
	22738	スターガード粒剤	
56	24413	マグアンプ K 殺虫剤入り	きゅうり及びピーマン(定植時/植穴土壌混和)

土壌処理シナリオでは、使用した農薬が花粉や花蜜へ直接暴露することではなく、土壌を介して移行した農薬が花粉や花蜜に残留する。このため、花の形態の違いが花粉や花蜜への農薬の残留に及ぼす影響は小さく、作物グループの異なる作物間での読み替えが可能であると考えられた。

そこで、代表作物として「かぼちゃ」を選定し、定植時に農薬を処理した花粉・花蜜残留試験(資料 8)が実施され、当該試験結果(表 12)を用いて、うり類(漬物用)、きゅうり、ズッキーニ、とうがらし(葉)、とうがらし類、ピーマン及びメロン(2 g/株)における推計暴露量の精緻化を行った。

なお、このうち、整理番号 1 については、育苗期の株元散布におけるきゅうり(2 g/株)、メロン(2 g/株)、ピーマン及びとうがらし類並びに、定植時の植穴土壌混和におけるきゅうり(2 g/株)、メロン(2 g/株)、ズッキーニ、ピーマン、とうがらし類及びとうがらし(葉)に対しては、リスク管理措置として「1.1 kg/10 a を超える場合は、閉鎖系施設栽培での使用に限る」を課すことで、また、整理番号 56 については、ピーマンに対し、リスク管理措置として「5.5 kg/10 a を超える場合は、閉鎖系施設栽培での使用に限る」を課すことで、「かぼちゃ」の花粉・花蜜残留値を精緻化に用いることが可能と判断した。

当該試験における花粉中及び花蜜中のジノテフラン残留濃度の推移を、それぞれ図 3 及び図 4 に示した。




図 3： かぼちゃの定植時にジノテフランを土壌処理した後の花粉中の残留濃度の推移




図 4： かぼちゃの定植時にジノテフランを土壌処理した後の花蜜中の残留濃度の推移

かぼちゃの花粉中におけるジノテフランの残留濃度は、処理約 26 日後において 0.02~0.07 mg/kg を示したが、その後はいずれの試験区においても低下傾向を示した。処理 29 日後以降は概ね 0.02 mg/kg 前後以下で推移した。試験区間で残留濃度に一定の差はみられるものの、時間の経過に伴い残留濃度が低下する傾向はいずれの試験区においてもおおむね共通していた。

かぼちゃの花蜜中におけるジノテフランの残留濃度は、処理 26 日後以降、概ね 0.01 mg/kg 程度と低い水準で推移し、大きな変動は認められなかった。試験区

間で残留濃度に若干の差はみられるものの、全体として残留濃度は低い値で推移する傾向、いずれの試験区においてもおおむね共通していた。

精緻化における単回経口暴露ではかぼちゃの試験における最大の残留値を用い、反復経口暴露ではかぼちゃの試験における7日間(処理日からの経過日数26~33日)の平均残留値(幾何平均値)を用いて暴露量を推計した。なお、平均値の算出の際は定量限界未満(<0.01 mg/kg)の値は、0.01 mg/kgとして計算した。

推計に用いた残留値を表24に示した。

表24：精緻化における暴露量の推計に用いた残留値

単回経口評価(花粉最大値)	0.07 mg/kg (処理量0.076 kg ai/ha)
反復経口評価(花粉平均値)	0.04 mg/kg (処理量0.076 kg ai/ha)
単回経口評価(花蜜最大値)	0.02 mg/kg (処理量0.076 kg ai/ha)
反復経口評価(花蜜平均値)	0.01 mg/kg (処理量0.076 kg ai/ha)

2.2.2.2.2 リスク評価結果(精緻化)

精緻化を行うことにより、すべての適用についてRQが0.4以下となったため、蜂群への影響は懸念されないとの評価結果となった(別添3及び表25~27)。

表 25：スタークル粒剤、アルバリン粒剤、ホクコースタークル粒剤及び三井東圧アルバリン粒剤の精緻化を実施した適用の RQ（上段：スクリーニング、下段：精緻化）

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量(μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法
									最大値		平均値		経口			経口			
									花粉	花蜜	花粉	花蜜	成虫		幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
花粉	花蜜	花粉	花蜜	単回	反復	成虫/ 単回	成虫/ 反復												
きゅうり	ハモク [△] リハ [△] エ 類	2 g/株* (1100 株/10 a)	育苗期	1100	株元散布	土壌 処理	PN	0.11										要	
	ハモク [△] リハ [△] エ 類等		定植時		植穴土壌 混和				0.063		0.0095		0.0078	0.73	0.95	0.0024			
	コナジ [△] ラミ類								0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26		0.0012
	アブラムシ類	1 g/株 (1100 株/10 a)	育苗期	1100	株元散布	土壌 処理	PN	0.11					0.0047		0.0039	0.36	0.47	0.0012	不要
									0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012	
	コナジ [△] ラミ類 等	2 g/株* (1100 株/10 a)	定植時	1100	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11					0.0095		0.0078	0.73	0.95	0.0024	要
					0.10				0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012		
うり類 (漬物用)	アザミ [△] マ類	2 g/株 (555 株/10 a)	定植時	1110	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11										不要	
	アブラムシ類 等										0.032	0.0048		0.0039	0.37	0.48	0.0012		
									0.10	0.029	0.058	0.015	0.0051	0.0026	0.0039	0.39	0.26	0.0012	
メロン	コナジ [△] ラミ類	2g/株* (590 株/10 a)	育苗期	1100	株元散布	土壌 処理	PN	0.11										要	
			定植時		植穴土壌 混和				0.034		0.0051		0.0042	0.39	0.51	0.0013			
	ハモク [△] リハ [△] エ 類	2 g/株* (590 株/10 a)	育苗期		株元散布				0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26		0.0012
	アザミ [△] マ類		定植時		植穴土壌 混和														
ズッキーニ	コナジ [△] ラミ類	2 g/株* (1110 株/10 a)	定植時	1100	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11					0.0095		0.0079	0.73	0.95	0.0024	要
	アブラムシ類									0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	

作物 名	適用 病虫害名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量(μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法			
									最大値		平均値		経口		幼虫	経口						
													成虫			成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫				
									花粉	花蜜	花粉	花蜜	単回	反復								
ピーマン	アザミウマ類	2 g/株* (1700 株/10 a)	定植時	1100	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.10				0.015		0.012	1.1	1.5	0.0037	要			
	アブラムシ類	1 g/株* (1700 株/10 a)		1100					0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012				
			コナジラミ類		育苗期			1100	株元散布	0.11	0.049				0.0073		0.0060	0.56		0.73	0.0018	
	0.10	0.029		0.058							0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012					
	とうがらし類	アザミウマ類	2 g/株* (2080 株/10 a)	定植時	1100			植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.12				0.018		0.015	1.4	1.8	0.0045	要
		アブラムシ類	1 g/株* (2080 株/10 a)		1100							0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012	
コナジラミ類				育苗期		1100	株元散布	0.11			0.060				0.0089		0.0074	0.69	0.89	0.0022		
		0.10	0.029		0.058						0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012					
とうがらし(葉)		アザミウマ類 等	1 g/株* (2080 株/10 a)	定植時 但し、 収穫 30 日 前まで	1100	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN			0.11	0.060				0.0089		0.0074	0.69	0.89	0.0022	要
												0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

*被害防止方法として「1.1 kg/10 a を超える場合は、閉鎖系施設栽培での使用に限る」を課す

表 26：スターガード粒剤の精緻化を実施した適用の RQ（上段：スクリーニング、下段：精緻化）

作物名	適用 病虫害名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナリオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量(μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法
									最大値		平均値		経口		経口				
													成虫		幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
									花粉	花蜜	花粉	花蜜	単回	反復					
きゅうり	ハモク [®] リハ [®] エ 類等	2 g/株* (1100 株/10 a)	定植時	1100	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.063				0.0095		0.0078	0.73	0.95	0.0024	要
	アブラムシ類 等								0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012	
メロン	ハモク [®] リハ [®] エ 類等	2 g/株* (590 株/10 a)	定植時	1100	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.034				0.0051		0.0042	0.39	0.51	0.0013	要
	コナジラミ類								0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012	
ピーマン	アブラムシ類	2 g/株* (1700 株/10 a)	定植時	1100	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.10				0.015		0.012	1.1	1.5	0.0037	要
									0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012	
	アブラムシ類	1 g/株* (1700 株/10 a)	1100	0.11	0.049				0.0073		0.0060	0.56	0.73	0.0018					
					0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012					
とうがらし類	アザミウマ類	2 g/株* (2080 株/10 a)	定植時	1100	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.12				0.018		0.015	1.4	1.8	0.0045	要
									0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012	
	アブラムシ類	1 g/株* (2080 株/10 a)	1100	0.11	0.060				0.0089		0.0074	0.69	0.89	0.0022					
					0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012					

※：適用作物の花粉・花蜜の有無（P：花粉，N：花蜜）

*被害防止方法として「1.1 kg/10 a を超える場合は、閉鎖系施設栽培での使用に限る」を課す

表 27：マグアンプ K 殺虫剤入りの精緻化を実施した適用の RQ（上段：スクリーニング、下段：精緻化）

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量(μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法
									最大値		平均値		経口		経口				
													成虫		幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
									花粉	花蜜	花粉	花蜜	単回	反復					
ピーマン	アブラムシ類	5 g/株* (1700 株/10 a)	定植時	5500	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.049				0.0073		0.0060	0.56	0.73	0.0018	要
									0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012	
きゅうり	アブラムシ類等	5 g/株 (1100 株/10 a)	定植時	5500	植穴土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.032				0.0047		0.0039	0.36	0.47	0.0012	不要
									0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無（P：花粉，N：花蜜）

*被害防止方法として「5.5 kg/10 a を超える場合は、閉鎖系施設栽培での使用に限る」を課す

2.2.3 種子処理シナリオ

該当なし

2.3 第2段階評価

稲の使用方法「散布、無人航空機による散布及び空中散布」の適用及びいね科牧草の使用方法「散布」の適用について、提出のあった蜂群への影響試験を用いて第2段階評価を実施した。

第2段階評価では、トンネル内において稲を試験作物として実施したトンネル試験（資料 10*及び 11**）を用いて、ジノテフランが蜂群に及ぼす影響を評価した。

なお、いね科牧草については、リスク管理措置として「150 L/10 a を超えて使用した場合は、開花前に収穫する」を課すことで、提出のあった蜂群への影響試験による第2段階評価が可能と判断した。

ミツバチが訪花中の稲にジノテフランを散布し、その後、約 50 日間蜂群を観察した結果、いずれの試験においても試験期間を通じて成虫の死虫数及び蜂群強度（蜂量）に影響は認められなかった。

このことから、稲の使用方法「散布、無人航空機による散布及び空中散布」の適用（投下量：0.025~0.15 kg ai/ha、散布濃度：0.0030~1.25 ai %）及びいね科牧草の使用方法「散布」の適用（投下量：0.30 kg ai/ha、散布濃度：0.010 ai %）について、蜂群への影響は懸念されないと評価結果となった（表 28-47）。

*投下量：0.15 kg ai/ha、散布濃度：0.075 ai %

**投下量：0.10 kg ai/ha、散布濃度：1.25 ai %

表 28：スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤、ホクコースタークル顆粒水溶剤及び三井東圧アルバリン顆粒水溶剤の稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用害虫名	最小希釈倍率(倍)	最大使用液量(L/10a)	使用時期	使用方法	※	有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液有効成分濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害防止方法
									試験条件				試験結果(資料10)		
									試験作物	処理方法	有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液有効成分濃度(%)	死虫数	蜂群強度(蜂量)	
稲	カメシ類	2000	150	収穫7日前まで	散布	P	0.15	0.010	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理区の間に統計的な有意な差なし	不要
	ウカ類等	3000					0.10	0.0067							
いね科牧草*	アブラムシ類	2000	300	—	散布	P	0.30	0.010	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理区の間に統計的な有意な差なし	要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

*被害防止方法として「150 L/10 a を超えて使用した場合は、開花前に収穫する」を課す

表 29：スタークル粉剤 DL、アルバリン粉剤 DL、ホクコースタークル粉剤 DL、三井東圧アルバリン粉剤 DL 及びスタークルトレボン粉剤 DL の稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	粉中 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
							試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
							試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	3 kg/10 a	収穫 7日前 まで	散布	P	0.15	0.50	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
									0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 30：ホクコーラブサイドスタークル粉剤 DL、ビームスタークル粉剤 5DL、スタークル L 粉剤 DL、スタークルメイト L 粉剤 DL、ビームスタークル微粒剤 F 及びブレードスタークル粉剤 DL) の稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	粉中 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
							試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
							試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	4 kg/10 a	収穫 7日前 まで	散布	P	0.14	0.35	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
									0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 31：ビームバシスタークル粉剤 5DL、ワイドナーエース粉剤 DL、日農ビームアプロードスタークル粉剤 5DL、クミアイビームアプロードスタークル粉剤 5DL、ビームモンカットスタークル F 粉剤 5DL、ホクコートップジンスタークル粉剤 DL、アプロードモンカットスタークル F 粉剤 DL、トライスタークル粉剤 DL 及びクミアイトライスタークル粉剤 DL の稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	粉中 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
							試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
							試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	4 kg/10 a	収穫 14日前 まで	散布	P	0.14	0.35	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
									0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 32：スタークル液剤 10 及びスタークルメイト液剤 10 の稲、いね科牧草の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	ウカ類等	30	3	収穫 7日前 まで	無人航空機 による散布	P	0.10	0.33	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
	ウカ類等	16	1.6		無人航空機に よる散布		0.10	0.63							
	ウカ類等	1000	150		散布		0.15	0.010							
	ウカ類等	300	25		散布		0.083	0.033							
	ウカ類等	8	0.8		無人航空機 による散布		0.10	1.25			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	
	ウカ類等	30	3		空中散布		0.10	0.33							
いね科 牧草*	アブラムシ 類	1000	300	—	散布	P	0.30	0.010	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

*被害防止方法として「150 L/10 a を超えて使用した場合は、開花前に収穫する」を課す

表 33：スタークルエアー50、スタークルメイトエアー50 及びファームスター顆粒水溶剤 50 の稲の適用の有効成分投下量
及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果(資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	カメシ類 等	40	0.8	収穫 7日前 まで	無人ヘリコプター による散布	P	0.10	1.25	稲	散布	0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
				空中散布											

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 34：ホクコーラブサイドスタークルフロアブルの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	いもち 病等	500	150	収穫 7日前 まで	散布	P	0.15	0.010	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
		150	25				0.083	0.033							
		4	0.8		無人ヘリコプター による散布		0.10	1.25			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	
					空中散布										

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 35：トレボンスター粉剤DLの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	粉中 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
								試験条件				試験結果(資料11)		
								試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	ニカメイチュウ等	4 kg/10 a	収穫 7日前 まで	散布	P	0.080	0.20	稲	散布	0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 36：ビームエイトスタークルゾルの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	いもち 病等	1000	150	収穫 7日前 まで	散布	P	0.15	0.010	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
		250	25				0.10	0.040							
		8	0.8		無人航空機 による散布		0.10	1.25			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 37：トレボンスターフロアブルの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	カメシ類 等	1000	150	収穫 14日 前 まで	散布	P	0.045	0.0030	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
	カメシ類	300	25		0.025		0.010								
	カメシ類 等	8	0.8		無人航空機 による散布		0.030	0.38			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 38：ビームモンセレンスタークル粉剤 5DL 及びサジェスト微粒剤 F の稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	粉中 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
							試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
							試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	4 kg/10 a	収穫 21日前 まで	散布	P	0.14	0.35	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
									0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 39：ダブルカットスタークル粉剤 DL、ダブルカットバリダスタークル粉剤 3DL 及びイッカツエース粉剤 DL の稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	粉中 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
							試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
							試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	4 kg/10 a	穂揃期 まで	散布	P	0.14	0.35	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
									0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 40：クミアイアプロードスタークルゾル及びアプロードスタークルゾルの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	ウカ類等	1000	150	収穫 7日前 まで	散布	P	0.14	0.0090	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
		8	0.8		無人航空機 による散布		0.090	1.1			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 41：ホクコートップジンスタークルフロアブルの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	いもち 病等	500	150	収穫 14日 前 まで	散布	P	0.15	0.010	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
		150	25				0.083	0.033							
		4	0.8		無人ヘリコプター による散布		0.10	1.25			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	
		15	3		空中散布		0.10	0.33							

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 42：ダブルカットスタークルフロアブルの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	いもち 病等	1000	150	穂揃 期 まで	散布	P	0.15	0.010	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
		300	25				0.083	0.033							
		8	0.8		無人航空機 による散布		0.10	1.25			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	
					空中散布										

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 43：ホクコートップジンスタークルフロアブルの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	いもち 病等	500	150	収穫 14日 前 まで	散布	P	0.15	0.010	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
		150	25				0.083	0.033							
		4	0.8		無人ヘリコプター による散布		0.10	1.25			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	
		15	3		空中散布		0.10	0.33							
		4	0.8		空中散布		0.10	1.25							

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 44：スタートレボン W10 の稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	いもち 病等	1000	150	収穫 14日 前 まで	散布	P	0.15	0.010	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
		8	0.8		無人航空機 による散布		0.10	1.25			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 45：ブレードスタークルゾルの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	ト初試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	いもち 病等	1000	150	収穫 7日前 まで	散布	P	0.15	0.010	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
		0.083	0.033												
		8	0.8		無人航空機 による散布		0.10	1.25			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 46：オーケストラスタークルエアーの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	ツマグロヨコ バイ等	1000	150	収穫 7日前 まで	散布	P	0.14	0.0090	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
		250	25				0.090	0.036							
		16	1.6		無人航空機 による散布		0.090	0.56			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	
		8	0.8				0.090	1.1							

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

表 47：ブレードスタークルR ゾルの稲の適用の有効成分投下量及び散布液中有効成分濃度とトンネル試験の試験条件の比較

作物名	適用 害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量 (L/10a)	使用 時期	使用 方法	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	トンネル試験の試験条件及び試験結果						被害 防止 方法
									試験条件				試験結果 (上段:資料10、下段:資料11)		
									試験 作物	処理 方法	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液 有効成分 濃度(%)	死虫数	蜂群強度 (蜂量)	
稲	ツマグロヨコ バイ等	1000	150	収穫 7日前 まで	散布	P	0.14	0.0090	稲	散布	0.15	0.075	影響の程度<10 %	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	不要
		0.075	0.030												
		8	0.8		無人航空機 による散布		0.090	1.1			0.10	1.25	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	陰性対照区と処理 区の間に統計的な 有意な差なし	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

V. リスク評価結果（まとめ）

ジノテフランについて、評価資料を用いて農薬蜜蜂影響評価を実施した。

ミツバチ個体に対する毒性評価では、申請者より提出された試験成績に報告のある半数致死量 (LD₅₀ または LDD₅₀) をもとにジノテフランのミツバチへの影響評価に用いる各種毒性指標値を以下のとおり定めた。

生育段階	毒性試験の種類	毒性指標値(単位)	
成虫	単回接触毒性	48 h LD ₅₀ (μg ai/bee)	0.062
	単回経口毒性		0.013
	反復経口毒性	10 d LDD ₅₀ (μg ai/bee/day)	0.010
幼虫	経口毒性	72 h LD ₅₀ (μg ai/bee)	3.3

ジノテフランのミツバチへの影響評価では、ジノテフランを有効成分として含む各種農薬製剤の適用（作物と使用方法の組み合わせ）をミツバチがジノテフランに「(1) 明らかに暴露しない適用」及び「(2) 暴露する可能性がある適用」に分類し、それぞれ検討した。

(1) 明らかに暴露しない適用 (IV.1.)

一度に広範囲かつ多量に使用されることがない製剤の場合や、適用作物が「開花前に収穫する作物」、「栽培期間中に開花しない作物」である場合には、明らかにミツバチが暴露しないと想定されるため、蜂群への影響は懸念されないと評価した。

以下にミツバチが暴露しないと想定される適用の例を示す。

一度に広範囲かつ多量に使用されることがない製剤の例：スプレー剤

開花前に収穫する作物の例：キャベツ、はくさい、レタス等

栽培期間中に開花しない作物の例：かんしょ、茶等

(2) 暴露する可能性がある適用 (IV.2.)

ア リスク管理措置を課すことで暴露しないと評価した適用 (IV.2.1.1)

ミツバチがジノテフランに暴露する可能性がある使用方法や作物であっても、使用場所や使用時期を制限する、または、開花を管理する等のリスク管理措置（被害防止方法）を課す適用については、ミツバチがジノテフランに暴露しないと想定されることから、蜂群への影響は懸念されないと評価した。

以下にミツバチがジノテフランに暴露しないためのリスク管理措置（被害防止方法）を課す適用の例を示す。

使用場所を制限する例：きく、きゅうり（花）等の散布による使用におい

て「閉鎖系施設栽培での使用に限る」を課す
使用時期を制限する例：なし、りんご等の果樹への散布による使用において
「発芽（萌芽）～落花（開花終了）までを除く期間
の使用に限る」を課す
開花を管理する例：かんきつ（苗木）の株元散布等による使用に
おいて「開花している場合は摘花してから使用し、
使用後は開花期終了まで摘花する」を課す

イ 暴露しないとみなせないため暴露量の推計を行った適用（IV.2.1.2 及び IV.2.2）

ミツバチがジノテフランに暴露する可能性がある使用方法や作物のうち、リスク管理措置を課すことで暴露しないと評価した適用（IV.2.1.1）以外については、第 1 段階評価を実施した。

なお、第 1 段階評価は、定めた毒性指標値をもとに、ミツバチの死亡率が蜂群への影響が懸念される水準である 10 %（自然死亡率）超としないかを評価するものである。ミツバチの推計暴露量の半数致死量に対する比率、RQ（リスク比）の概念を導入し、RQ が 0.4 を超えない場合には、農薬への暴露によるミツバチの死亡率は 10 %を超えず、蜂群への影響は懸念されないと評価した。

暴露量の推計に当たっては、使用方法等により、各適用を 2 つのシナリオ（茎葉散布シナリオまたは土壌処理シナリオ）のいずれかに分類した。

・茎葉散布シナリオ

第 1 段階評価の結果、わさびの使用時期「畑育苗期」、使用方法「散布」の適用において、成虫単回経口暴露、成虫反復経口暴露及び幼虫経口暴露の RQ が 0.4 を超えたことから、提出のあった花粉・花蜜残留試験を用いて精緻化を行った結果、RQ が 0.4 以下となった。

また、稲の使用方法「散布、無人航空機による散布及び空中散布」の適用等において、成虫単回接触暴露、成虫単回経口暴露または成虫反復経口暴露のいずれかの RQ が 0.4 を超えたため、提出のあった蜂群への影響試験を用いて第 2 段階評価を実施した。

第 2 段階評価を行った結果、稲の適用について成虫の死亡数及び蜂群強度（蜂量）に影響は認められなかったことから、蜂群への影響は懸念されないと評価した。いね科牧草については、使用量を制限するリスク管理措置（被害防止方法）を課すことで蜂群への影響は懸念されないと評価結果となった。

・土壌処理シナリオ

第 1 段階評価（スクリーニング）の結果、稲（箱育苗）、トマト、なす等の

適用について、RQ が 0.4 を超えないことを確認した。


その他の適用においては、成虫単回経口暴露または成虫反復経口暴露のいずれかの RQ が 0.4 を超えたため、提出のあった花粉・花蜜残留試験を用いて精緻化を行った。その結果、ピーマンやとうがらし類等では使用量を制限するリスク管理措置（被害防止方法）を課す必要があるものの、すべての適用で RQ が 0.4 以下となった。

以上の結果、ジノテフランは、申請された使用方法やリスク管理措置（被害防止方法）に基づき使用される限りにおいて、ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはないと考えられる。

(参考)

農薬蜜蜂影響評価部会における審議の進め方

(括弧内はジノテフランの評価における項目番号)



評価資料

資料 番号	報告年	題名、出典 (試験施設以外の場合) 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況 (必要な場合)、公表の有無
1	1999	MTI-446原体のミツバチに対する急性接触毒性試験 社団法人日本植物防疫協会研究所 試験番号：ETC-99-035、報告書番号：DET46 未公表
2	1999	MTI-446原体のミツバチに対する急性経口毒性試験 社団法人日本植物防疫協会研究所 試験番号：ETC-99-034、報告書番号：DET47 未公表
3	2000	ACUTE CONTACT AND ORAL TOXICITY OF MTI-446, ACTIVE TO HONEY BEES LANDIS INTERNATIONAL, INC. Report No.:41421F001、報告書番号：DET30 GLP、未公表
4	2015	Dinotefuran Technical: Assessment of Effects on the Adult Honey Bee, <i>Apis mellifera</i> L., in a 10 Day Chronic Feeding Test under Laboratory Conditions Eurofins Agroscience Services, Inc. Report No.:S15-05258-L1、報告書番号：DET31 GLP、未公表
5	2015	DINOTEFURAN: AN ACUTE LARVAL TOXICITY STUDY WITH THE HONEY BEE (<i>Apis mellifera</i>) WILDLIFE INTERNATIONAL Report No.:236P-103D、報告書番号：DET32 GLP、未公表
6	2020	水稻における花粉中農薬残留量測定試験 (ジノテフラン) 株式会社エスコ 試験番号：E19-003-001、報告書番号：DET35 未公表
7	2021	アトラクトン箱粒剤 水稻花粉残留試験 一般社団法人日本植物防疫協会 試験番号：JP2020P802、報告書番号：DET36 GLP、未公表
8	2022	アルバリン粒剤 かぼちゃ 花粉・花蜜残留試験 一般社団法人日本植物防疫協会 試験番号：JP2021P804、報告書番号：DET37 GLP、未公表
9	2022	アルバリン顆粒水溶剤 かぼちゃ 花粉・花蜜残留試験 一般社団法人日本植物防疫協会 試験番号：JP2021P805、報告書番号：DET38 GLP、未公表
10	2020	Assessments of Side-Effects of Dinotefuran applied as 12 % GR followed by an Application with the 10 % SL Formulation on Honeybees (<i>Apis mellifera</i> L.) in the Semi-Field in Rice in USA in 2019 Eurofins Agroscience Services Ecotox GmbH Report No.:S19-04558、報告書番号：DET33 未公表

資料 番号	報告年	題名、出典 (試験施設以外の場合) 試験施設、報告書番号 GLP 適合状況 (必要な場合)、公表の有無
11	2021	Assessments of Side-Effects of Dinotefuran applied as 12 % GR followed by an Aerial Application with the 10 % SL Formulation on Honeybees (<i>Apis mellifera</i> L.) in the Semi-Field in Rice in USA in 2020 Eurofins Agroscience Services Ecotox GmbH Report No.:S20-03340、報告書番号 : DET34 未公表
12	2000	MTI-446 Product Chemistry Ricerca, LCC Report No.:011098-1、報告書番号 : DP1 GLP、未公表
13	2001	ADSORPTION/DESORPTION OF ¹⁴ C -MTI-446 ON SOILS RCC Ltd Report No.:728998、報告書番号 : DEF22 GLP、未公表
14	2021	[¹⁴ C]Dinotefuran: Adsorption Study on Volcanic Ash Soil The Institute of Environmental Toxicology Report No.:IET 20-8002、報告書番号 : DEF23 GLP、未公表
15	2022 (2022 修正)	公表文献に関する報告書 有効成分名 : ジノテフラン 公表
16	2024	公表文献調査報告書(追補) 有効成分名 : ジノテフラン 公表

評価資料 (公表文献)

資料 番号	文献 整理 番号	著者	出版年	論文表題	掲載誌名、 号、ページ等
17	2	Chen, Z.L.; Yao, X.M.; Dong, F.S.; Duan, H.X.; Shao, X.S.; Chen, X.; Yang, T.; Wang, G.R.; Zheng, Y.Q.	2019	Ecological toxicity reduction of dinotefuran to honeybee: New perspective from an enantiomeric level	Environment International, 130

別添 1：適用病害虫の範囲及び使用方法（ジノテフラン）

目 次

1.	登録番号 20805：スタークル粒剤、 登録番号 20806：アルバリン粒剤、 登録番号 20807：ホクコースタークル粒剤、 登録番号 20959：三井東圧アルバリン粒剤、 登録番号 22738：スターガード粒剤 （ジノテフラン 1.0 %粒剤）	6
2.	登録番号 20808：スタークル箱粒剤、 登録番号 20960：三井東圧アルバリン箱粒剤 （ジノテフラン 2.0 %粒剤）	15
3.	登録番号 20811：スタークル顆粒水溶剤、 登録番号 20812：アルバリン顆粒水溶剤、 登録番号 20813：ホクコースタークル顆粒水溶剤、 登録番号 20961：三井東圧アルバリン顆粒水溶剤、 登録番号 22130：わさび用緑風 SG （ジノテフラン 20.0 %水溶剤）	16
4.	登録番号 20814：スタークル粉剤 DL、 登録番号 20815：アルバリン粉剤 DL、 登録番号 20816：ホクコースタークル粉剤 DL、 登録番号 20962：三井東圧アルバリン粉剤 DL （ジノテフラン 0.50 %粉剤）	26
5.	登録番号 20836：スタークルトレボン粉剤 DL （エトフェンプロックス 0.30 %・ジノテフラン 0.50 %粉剤）	27
6.	登録番号 21025：ホクコーラブサイドスタークル粉剤 DL （ジノテフラン 0.35 %・フサライド 2.5 %粉剤）	27
7.	登録番号 21027：ビームスタークル粉剤 5 DL （ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤）	27
8.	登録番号 21191：ビームバシスタークル粉剤 5 DL （ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・メプロニル 3.0 %粉剤）	28
9.	登録番号 21228：側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤 （ジノテフラン 4.0 %・プロベナゾール 48.0 %水和剤）	28
10.	登録番号 21248：スタークル L 粉剤 DL、 登録番号 21435：スタークルメイト L 粉剤 DL （ジノテフラン 0.35 %粉剤）	28

1 1. 登録番号 21259 : スタークル液剤 10、 登録番号 21260 : スタークルメイト液剤 10、 登録番号 24582 : アルバリン液剤 10 (ジノテフラン 10.0 %液剤)	29
1 2. 登録番号 21276 : スタークル 1 キロ H 粒剤、 登録番号 21277 : スタークルメイト 1 キロ H 粒剤 (ジノテフラン 3.0 %粒剤)	32
1 3. 登録番号 21496 : ビルダースタークル箱粒剤、 登録番号 21497 : ホクコービルダースタークル箱粒剤 (ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %粒剤)	32
1 4. 登録番号 21607 : スタークルエアー50、 登録番号 21608 : スタークルメイトエアー50、 登録番号 24012 : ファームスター顆粒水溶剤 50 (ジノテフラン 50.0 %水溶剤)	32
1 5. 登録番号 21710 : ホクコーラブサイドスタークルフロアブル (ジノテフラン 5.0 %・フサライド 12.0 %水和剤)	33
1 6. 登録番号 21801 : ワイドナーエース粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・ブプロフェジン 1.0 %・フサライド 2.5 %・フル トラニル 2.0 %粉剤)	33
1 7. 登録番号 21871 : コラトップスタークル 1 キロ粒剤 (ジノテフラン 5.0 %・ピロキロン 15.0 %粒剤)	34
1 8. 登録番号 21886 : イモチエーススタークル粒剤、 登録番号 21888 : ホクコーイモチエーススタークル粒剤 (ジノテフラン 1.67 %・メトミノストロビン 4.0 %粒剤)	34
1 9. 登録番号 21975 : トレボンスター粉剤 DL (エトフェンプロックス 0.40 %・ジノテフラン 0.20 %粉剤)	34
2 0. 登録番号 22036 : ビームエイトスタークルゾル (ジノテフラン 10.0 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)	35
2 1. 登録番号 22037 : トレボンスターフロアブル (エトフェンプロックス 7.0 %・ジノテフラン 3.0 %水和剤)	35
2 2. 登録番号 22063 : 日農ビームアプロードスタークル粉剤 5 DL、 登録番号 22064 : クミアイビームアプロードスタークル粉剤 5 DL (ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.0 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)	36
2 3. 登録番号 22102 : ビームモンセレンスタークル粉剤 5 DL (ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉剤)	36
2 4. 登録番号 22180 : サジェスト微粒剤 F (ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉粒剤)	36

2 5. 登録番号 22268 : ビームモンカットスタークル F 粉剤 5 DL (ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)	37
2 6. 登録番号 22332 : スタークル豆つぶ、 登録番号 22333 : クミアイスタークル豆つぶ、 登録番号 22495 : スタークルメイト豆つぶ (ジノテフラン 12.0 %剤)	37
2 7. 登録番号 22416 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤、 登録番号 22417 : 明治 Dr. オリゼスタークル箱粒剤、 登録番号 23950 : オリザエートスター箱粒剤 (ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 25.0 %剤)	登 37
2 8. 登録番号 22426 : ビームスタークル微粒剤 F (ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)	38
2 9. 登録番号 22479 : ダブルカットスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.11 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)	38
3 0. 登録番号 22642 : ホクコートップジンスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・チオフアネートメチル 2.0 %粉剤)	38
3 1. 登録番号 22660 : MIC ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤 (クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %剤)	39
3 2. 登録番号 22661 : クミアイアプロードスタークルゾル、 登録番号 22662 : アプロードスタークルゾル (ジノテフラン 9.0 %・ブプロフェジン 18.0 %水和剤)	39
3 3. 登録番号 22725 : キックオフ顆粒水和剤 (クロラントラニリプロール 4.0 %・ジノテフラン 15.0 %水和剤)	40
3 4. 登録番号 22784 : アプロードモンカットスタークル F 粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.5 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)	41
3 5. 登録番号 22924 : ホクコートップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン 5.0 %・チオフアネートメチル 20.0 %水和剤)	42
3 6. 登録番号 22981 : ダブルカットバリダスタークル粉剤 3 DL (ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %粉剤)	42
3 7. 登録番号 22995 : ダブルカットスタークルフロアブル (ジノテフラン 10.0 %・カスガマイシン 1.37 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)	43
3 8. 登録番号 23074 : アトラクトン箱粒剤、 登録番号 24075 : スターダム箱粒剤 (ジノテフラン 12.0 %剤)	43

3 9.	登録番号 23076 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、 登録番号 23077 : 明治 Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、 登録番号 23078 : ロングリーチ箱粒剤 (ジノテフラン 12.0 %・プロベナゾール 24.0 %粒剤)	44
4 0.	登録番号 23113 : イッカツエース粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・ バリダマイシン 0.30 %粉剤)	44
4 1.	登録番号 23365 : フェルテラスタークル箱粒剤 CU (クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %粒剤)	45
4 2.	登録番号 23370 : スケルカット顆粒水和剤、 登録番号 23371 : スケルノック顆粒水和剤 (ジノテフラン 40.0 %水和剤)	45
4 3.	登録番号 23372 : スターガードプラス AL (ジノテフラン 0.010 %・ペンチオピラド 0.010 %水和剤)	46
4 4.	登録番号 23405 : トライスタークル粉剤 DL、 登録番号 23407 : クミアイトライスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・テブフロキン 1.0 %粉剤)	48
4 5.	登録番号 23506 : オールスタースプレー (ジノテフラン 0.010 %液剤)	49
4 6.	登録番号 23624 : ウッドスター、 登録番号 23676 : ウッドセーバー (ジノテフラン 8.0 %液剤)	53
4 7.	登録番号 23685 : ハイポネックス原液 殺虫剤入り (ジノテフラン 2.5 %複合肥料)	54
4 8.	登録番号 23705 : サンブラススタークル箱粒剤 (ジノテフラン 2.0 %・トルプロカルブ 12.0 %粒剤)	54
4 9.	登録番号 23706 : ガッツスター粒剤、 登録番号 23707 : ゴウケツモンスター粒剤 (ジノテフラン 1.67 %・シメコナゾール 1.5 %・トルプロカルブ 3.0 %粒剤)	55
5 0.	登録番号 23708 : サントリプル箱粒剤、 登録番号 23840 : サンフェスタ箱粒剤 (クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %・トルプロカルブ 4.0 %粒剤)	55
5 1.	登録番号 23833 : ハイパーキック箱粒剤、 登録番号 23834 : ゴウケツバスター箱粒剤 (ジノテフラン 12.0 %・トルプロカルブ 9.0 %粒剤)	56
5 2.	登録番号 24316 : アースガーデン 4 (エトフェンプロックス 0.020 %・ジノテフラン 0.010 %・ミルベメクチン 0.00050 %・ペンチオ ピラド 0.010 %水和剤)	57

5 3. 登録番号 24344 : スタートレボン W10 (エトフェンプロックス 10.0 %・ジノテフラン 10.0 %乳剤)	58
5 4. 登録番号 24346 : ブレードスタークルゾル (ジノテフラン 10.0 %・フェリムゾン 15.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)	59
5 5. 登録番号 24347 : ブレードスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)	59
5 6. 登録番号 24413 : マグアンプ K 殺虫剤入り (ジノテフラン 0.20 %複合肥料)	60
5 7. 登録番号 24530 : オーケストラスタークルエアー (ジノテフラン 9.0 %・ベンズピリモキサシ 10.0 %水和剤)	60
5 8. 登録番号 24608 : ブレードスタークル R ゾル (ジノテフラン 9.0 %・フェリムゾン 13.5 %・フサライド 13.5 %水和剤)	61

1. 登録番号 20805 : スタークル粒剤、
登録番号 20806 : アルバリン粒剤、
登録番号 20807 : ホクコースタークル粒剤、
登録番号 20959 : 三井東圧アルバリン粒剤、
登録番号 22738 : スターガード粒剤
(ジノテフラン 1.0 %粒剤)

(1) スタークル粒剤、アルバリン粒剤、ホクコースタークル粒剤及び三井東圧アルバリン粒剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	ウカ類 ツグロコバイ コメテウ イトメイシ カミシ類 イヌゾウムシ	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理及び測条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
きゅうり	ハダニ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
	ハダニ類 アザミヤ類		定植時		植穴土壌混和	
	コジラミ類	1g/株	育苗期		株元散布	
	アブラムシ類		生育期 但し、収穫開始 14日前まで			
	コジラミ類 アブラムシ類				1~2g/株	定植時
	うり類 (漬物用)	アザミヤ類	2g/株		定植時	
アブラムシ類 コジラミ類		1~2g/株				
メロン	アブラムシ類	1g/株	育苗期		株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)
	コジラミ類	1~2g/株	定植時		植穴土壌混和	
			育苗期		株元散布	
			定植時		植穴土壌混和	
			ハダニ類		2g/株	
	アザミヤ類	定植時	植穴土壌混和			
すいか	ワタアブラムシ	2g/株	定植時		植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
			生育期 但し、収穫21日前まで		株元散布	
			育苗期			
かぼちゃ	アブラムシ類 コジラミ類	定植時	植穴土壌混和		3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌漑は合計1回以内、散布は2回以内)	
にがうり	コジラミ類				3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメチアノを含む農薬の総使用回数
ズッキーニ	コジラミ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 定植後の株元散布は1回以内、 散布は2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布	
なす	ハダカアザミ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、散 布及び定植後の株元散布は合計 2回以内)
	ハダカアザミ類 アザミ類	1~2g/株	定植時		植穴土壌混和	
	コジラミ類		育苗期	株元散布		
	アブラムシ類	1g/株	定植時	植穴土壌混和		
	コジラミ類 アブラムシ類		生育期 但し、収穫前日 まで	2回以内	株元散布	
ピーマン	アザミ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布及び定植後の株元散布は 合計2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫前日 まで	2回以内	株元散布	
			育苗期	1回		
トマト ミニトマト	コジラミ類	培土1L 当り 10g	播種前		1回	培土混和
	ハダカアザミ類 コジラミ類	1~2g/株	定植時	植穴土壌混和		
			育苗期	2回以内	株元散布	
	コジラミ類	1g/株	生育期 但し、収穫前日 まで			
	アブラムシ類		定植時	1回	植穴土壌混和	
とうがらし類	アザミ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、 定植後の株元散布は1回以内、 散布は2回以内)
	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、収穫開始 14日前まで		株元散布	
			育苗期			
とうがらし(葉)	アザミ類 アブラムシ類		定植時 但し、収穫30 日前まで		植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、 散布は2回以内)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジ・アクトを含む 農薬の総使用回数
キャベツ	アブラムシ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	3回以内 (育苗期の株元散布、定植時の 土壌混和及び灌漑は合計1回 以内、散布及び無人航空機散 布は合計2回以内)
	アオムシ コガ	2~3g/株	定植時		植穴土壌混和	
	ハマダラカメムシ	3g/株				
はくさい	アブラムシ類	2g/株				3回以内(定植時の土壌 混和及び灌漑は合計 1回以内、散布及び無人 航空機散布は合計 2回以内)
	アオムシ コガ	2~3g/株				
	ハマダラカメムシ	3g/株				
ブロッコリー	アブラムシ類 コガ	2g/株				3回以内 (定植時の土壌混和及び灌漑は 合計1回以内、 散布及び無人航空機散布は合 計2回以内)
ねぎ	アザミヤ類 ハダカリハエ類	6kg/10a	播種時	2回以内	播種土壌混和	4回以内 (播種時の土壌混和、育苗トレイへ の灌漑及び定植時の株元散布 は合計1回以内、生育期の株 元灌漑は1回以内、散布、 無人航空機散布及び定植後の 株元散布は合計2回以内)
			定植時		株元散布	
	アザミヤ類 カバネコハエ類	生育期 但し、収穫3日 前まで				
	ハダカリハエ類	6~9kg/10a				
わけぎ	アザミヤ類 ハダカリハエ類	6kg/10a	生育期 但し、収穫21 日前まで	1回		4回以内 (定植後の株元散布は1回以 内、生育期の株元灌漑は 1回以内、散布は2回以内)
らっきょう	アザミヤ類 ハダカリハエ類		生育期 但し、収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
にんじん	ハダカリハエ類	9kg/10a	播種時	1回	播種土壌混和	4回以内 (播種時の土壌混和は1回以 内、生育期の株元灌漑は 1回以内、散布は2回以内)
セリ	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以 内、散布は2回以内)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメアノを含む農薬の総使用回数	
だいこん	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播溝土壌混和	5回以内 (は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	
	キジノミミシ	4-6kg/10a			全面土壌混和		
		9~12kg/10a			散布		
		6kg/10a	生育期 但し、 収穫30日前まで				
タネバエ							
チンゲンサイ	キジノミミシ	6kg/10a	定植時		土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く)	アブラムシ類 キジノミミシ		は種時		播溝土壌混和	3回以内 (は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	
							かぶ
							ほうれんそう
レタス 非結球レタス	ハモグリバエ						培土1L 当り 15g 1g/株
	アブラムシ類 ハモグリバエ	2g/株	定植時		植穴土壌混和		
しゅんぎく	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時		播溝土壌混和	3回以内 (は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	
			定植時		植溝土壌混和		
いちご	ワアブラムシ				0.5~1g/株		
かんきつ (苗木)	カンモグリガ	20g/株	育苗期		5回以内	株元散布	5回以内
なし (苗木)	アブラムシ類	20g/株 (但し、10a 当り 110kg まで)	育苗期		1回	株元散布	1回
くわい	アブラムシ類	3kg/10a	収穫30 日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
ふき		20kg/10a	定植後～ 生育期 (草丈20cm 頃 まで) 但し、収穫45 日前まで	1回	土壌表面散布	3回以内 (土壌表面散布は1回以内、 散布は2回以内)	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメチアノを含む農薬の総使用回数
しょうが	クハバネノハエ類	9kg/10a	生育期 但し、収穫14日前まで	1回	株元散布	3回以内 (株元散布は1回以内、散布は2回以内)
オクラ	アブラムシ類		生育期 但し、収穫開始14日前まで			
さやえんどう 実えんどう	ハダカトリバエ類					
だいず えだまめ	アズビヒハムシ	6kg/10a	播種時		播種土壌混和	3回以内 (播種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
さとうきび	カンヤコバネノハムシ	6-9kg/10a	生育期 但し、 収穫45日前まで	2回以内	散布	5回以内 (粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内)
	メヨウシロ類	9kg/10a				
葉ごぼう	アブラムシ類	6kg/10a	播種時	1回	全面土壌混和	2回以内 (播種時の全面土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内)
			生育期 但し、収穫21日前まで		株元散布	
しそ	デイトカハムシ	2g/株 (但し、10a当り 25kgまで)	定植時		植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
食用ぎく	アブラムシ類	1g/株 (但し、10a当り 30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
		20kg/10a	生育期 但し、収穫 前日まで	3回以内	株元散布	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内)
	マメトリバエ	2g/株 (但し、10a当り 30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
茶	クハバネノハムシ	12kg/10a	摘採7日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内
きく ガーベラ	マメトリバエ	2g/株 (但し、10a当り 30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	コジラ類 アブラムシ類	1g/株 (但し、10a当り 30kgまで)				
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	
花き類・ 観葉植物 (きく、 ガーベラを除く)	コジラ類 アブラムシ類	1g/株 (但し、10a当り 30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は1回以内)
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	
つつじ類	ツツジゲンバイ	6kg/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
いぐさ	イグサノミガ	3-4kg/10a				

(2) スターガード粒剤

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジメフェンを含む 農薬の総使用回数
きゅうり	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	4 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、定植後の 株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
	アブラムシ類 コナジラミ類	1~2 g/株			株元散布	
		1 g/株	生育期 但し、 収穫開始 14 日前まで			
メロン	ハモグリバエ類 アザミウマ類	2 g/株	定植時		植穴 土壌混和	3 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
	アブラムシ類	1 g/株				
	コナジラミ類	1~2 g/株				
すいか	ワタアブラムシ	2 g/株	生育期 但し、収穫 21 日前まで		株元散布	4 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、定植後の 株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類	2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	3 回以内 (定植時の土壌混和及び 育苗トレイへの灌注は 合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
なす	ハモグリバエ類 アザミウマ類	1~2 g/株	定植時			
	コナジラミ類	1 g/株	生育期 但し、 収穫前日まで			
	アブラムシ類		定植時	1 回	植穴 土壌混和	5 回以内 (培土混和及び灌注は 合計 1 回以内、育苗期の 株元散布は 1 回以内、 定植時の土壌混和は 1 回以内、散布及び定植 後の株元散布は 合計 2 回以内)
トマト ミニトマト	コナジラミ類	1 g/株	生育期 但し、 収穫前日まで	2 回 以内	株元散布	
	アブラムシ類		定植時			

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメフェンを含む農薬の総使用回数	
ピーマン	アザミウマ類	1~2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	3 回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 2 回以内)	
	アブラムシ類	1 g/株		2 回以内	株元散布		
とうがらし類	アザミウマ類	1~2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	4 回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、定植後の株元散布は 1 回以内、散布は 2 回以内)	
	アブラムシ類	1 g/株	生育期 但し、 収穫開始 14 日前まで		株元散布		
キャベツ	アブラムシ類	2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	3 回以内 (育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計 1 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 2 回以内)	
	アオムシ コナガ	2~3 g/株					
	ハイマダラノメイガ	3 g/株					
はくさい	アブラムシ類	2 g/株				植穴 土壌混和	3 回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計 1 回以内、散布は 2 回以内)
	アオムシ コナガ	2~3 g/株					
	ハイマダラノメイガ	3 g/株					
ブロッコリー	アブラムシ類 コナガ	2 g/株	定植時			株元散布	3 回以内 (定植時の土壌混和及び灌注は合計 1 回以内、散布及び無人航空機散布は合計 2 回以内)
ねぎ	アザミウマ類 ハモグリバエ類	6 g/m ²	生育期 但し、 収穫 3 日前 まで	2 回以内			
にんじん	ハモグリバエ類	9 g/m ²	は種時	1 回	播溝 土壌混和	4 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、生育期の株元灌注は 1 回以内、散布は 2 回以内)	

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジメチアザンを含む農薬の総使用回数
だいこん	アブラムシ類	6 g/m ²	は種時	1 回	播溝 土壌混和	5 回以内 (は種時の播溝土壌混和は 1 回以内、 は種時の全面土壌混和は 1 回以内、 粒剤の散布は 1 回以内、 水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計 2 回以内)
	キスジノミハムシ	4~6 g/m ²			全面 土壌混和	
		9 g/m ²			散布	
		6 g/m ²	生育期 但し、 収穫 30 日前 まで			
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6 g/m ²	定植時	1 回	土壌混和	3 回以内 (は種時及び定植時の土 壌混和は合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
非結球あぶら な科葉菜類 (チンゲンサイを除く)	アブラムシ類 キスジノミハムシ		は種時		播溝 土壌混和	3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回 以内)
かぶ						3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布、空中 散布、無人航空機散布 は合計 2 回以内)
ほうれんそう	アブラムシ類					3 回以内 (は種時及び定植時の土 壌混和は合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
だいず えだまめ	フタスジヒメハムシ					
しゅんぎく	ハモグリバエ類		9 g/m ²		定植時	植溝 土壌混和
いちご	ワタアブラムシ	0.5~1 g/株	植穴 土壌混和	1 回		
オクラ	アブラムシ類	9 g/m ²	生育期 但し、 収穫開始 14 日前まで		株元散布	3 回以内 (株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
さやえんどう	ハモグリバエ類					

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフエンを含む農薬の総使用回数
レタス	アブラムシ類 ナモグリハエ	2 g/株	定植時	1 回	植穴 土壌混和	4 回以内 (は種前の培土混和は 1 回以内、 育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 育苗トレイへの灌注は 合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
しそ	マデイロコナカイガラ ムシ	2 g/株 (但し、1 m ² 当り 25 g まで)				3 回以内 定植時の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内)
きく ガーベラ	マメハモグリハエ	2g/株 (但し、1 m ² 当り 30 g まで)	定植時	1 回	植穴 土壌混和	5 回以内 (土壌混和は 1 回以内)
	コナジラミ類 アブラムシ類	1 g/株 (但し、1 m ² 当り 30 g まで)				
	花き類・ 観葉植物 (きく、ガーベ ラを除く)	アブラムシ類	20 g/m ²	生育期	5 回以 内	
1 g/株 (但し、1 m ² 当り 30 g まで)			定植時	1 回	植穴 土壌混和	
		コナジラミ類				
つつじ類	ツツジゲンハイ	6 g/m ²	発生初期	5 回以 内	株元散布	5 回以内

2. 登録番号 20808 : スタークル箱粒剤、
登録番号 20960 : 三井東圧アルバリン箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネミスジウメシ イネトノヨイムシ イネコカメムシ	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	は種前	1 回	育苗箱の 床土又は覆 土に均一に 混和する。	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計 1 回以内、本 田での散布、 空中散布、 無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)
	は種時覆土前 ～ 移植当日		育苗箱の上 から均一に 散布する。			
	移植 3 日前 ～ 移植当日					
	ニカメイチュウ フタホシコヤカ					

3. 登録番号 20811 : スタークル顆粒水溶剤、
登録番号 20812 : アルバリン顆粒水溶剤、
登録番号 20813 : ホクコースタークル顆粒水溶剤、
登録番号 20961 : 三井東圧アルバリン顆粒水溶剤、
登録番号 22130 : わさび用緑風 SG
(ジノテフラン 20.0 %水溶剤)

(1) スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤、ホクコースタークル顆粒水溶剤及び
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノフランを 含む農薬の 総使用回数		
稲	—	カメシ類	2000 倍	60~150 L/10 a	収穫7 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及 び側条施用は合計 1 回以内、本田での 散布、空中散布、無人 航空機散布は合計 3 回以内)		
		ウカ類 ツマグロヨコバイ	3000 倍							
未成熟 とうもろこし		アブラムシ類 カメシ類	2000 倍	100~300 L/10 a	収穫前 日まで			2 回 以内	3 回以内 (育苗期の株元散 布及び定植時の土 壌混和は合計 1 回 以内、散布及び 定植後の株元散布 は合計 2 回以内)	
とうもろこし (子実)		ムギクビレアブラムシ カメシ類								
ピーマン		アブラムシ類	3000 倍							
		コナジラミ類	2000~ 3000 倍							
		アザミウマ類 カメシ類	2000 倍							
トマト ミニトマト		コナジラミ類	100 倍	化成型育苗 トレイ 1 箱 または ペーパーポット 1 冊 (30×60 cm・使用 土壌約1.5~4.0 L) 当り 0.5L	鉢上時 又は 定植時	1 回	灌注	5 回以内 (培土混和及び灌 注は合計 1 回以 内、育苗期の株元 散布は 1 回以内、 定植時の土壌混和 は 1 回以内、散布 及び定植後の 株元散布は 合計 2 回以内)		
			2000~ 3000 倍	100~300 L/10 a	収穫前 日まで	2 回 以内	散布			
		カメシ類	2000 倍							
なす		コナジラミ類	2000~ 3000 倍	アザミウマ類 カメシ類	2000 倍				3 回以内 (育苗期の株元散 布及び定植時の 土壌混和は合計 1 回以内、散布 及び定植後の株 元散布は合計 2 回以内)	
		アブラムシ類	3000 倍							

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
とうがらし類	—	アブラムシ類	3000 倍	100~300 L/10 a	収穫前 日まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗期の株元散 布及び定植時の土 壌混和は合計 1 回以内、 定植後の 株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回 以内)
とうがらし (葉)		コナジラミ類	2000~ 3000 倍		収穫 14 日前ま で			3 回以内 (定植時の 土壌混和は 1 回以内、 散布は 2 回 以内)
		アブラムシ類	3000 倍					
		アザミウマ類	2000 倍					
		コナジラミ類	2000 倍					
アブラムシ類		100 倍			セ成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット1 冊(30×60 cm・ 使用土壌 約1.5~40L)当 り0.5L			定植前日 ~ 定植時
きゅうり		アブラムシ類 コナジラミ類	2000~ 3000 倍	100~300 L/10 a	収穫 前日 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混 和は合計1回以内、 定植後の株元散布は 1 回以内、散布は 2 回以内)
		アザミウマ類 ウリハムシ カメムシ類	2000 倍					4 回以内 (育苗期の株元散布 及び定植時の土壌混 和は合計1回 以内、定植後の株元 散布は1回以内、 散布は2回以内)
すいか		アブラムシ類	2000~ 3000 倍		収穫7 日 前まで			

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
メロン	ー	コシジラミ類	2000~30 00倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	2回 以内	散布	3回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計1回以内、 散布は2回以内)
		アブラムシ類	3000倍		収穫 前日 まで			3回以内 (定植時の土壌混和は 1回以内、散布は 2回以内)
アザミウマ類		2000倍	収穫 前日 まで					4回以内 (定植時の土壌混和は1回 以内、定植後の株元散布 は1回以内、 散布は2回以内)
コシジラミ類 アザミウマ類					2000~ 3000倍			
アブラムシ類		3000倍	収穫 前日 まで					3回以内 (定植時の土壌 混和及び灌注は 合計1回以内、 散布及び無人航空機散 布は合計2回以内)
コシジラミ類					2000倍			
ズッキーニ		アブラムシ類	3000倍					収穫 前日 まで
まくわうり		アブラムシ類 コシジラミ類			2000~ 3000倍			
きゅうり(葉)		アブラムシ類	2000~ 3000倍					収穫 前日 まで
きゅうり(花)		アブラムシ類		2000~ 3000倍	収穫 前日 まで	3回以内 (定植時の土壌 混和及び灌注は 合計1回以内、 散布及び無人航空機散 布は合計2回以内)		
ブロッコリー		アブラムシ類 コガ	100倍				セリ成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60 cm・ 使用土壌 約1.5~4.0L)当り 0.5L	定植時
はくさい		アブラムシ類	2000~ 3000倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	2回 以内	散布	3回以内 (定植時の土壌混和 及び灌注は合計1回 以内、散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
	キジノミルシ ダコニルシ	2000倍						
キャベツ	ー	アブラムシ類	2000~ 3000倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	2回 以内	散布	3回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 灌注は合計1回 以内、散布及び 無人航空機散布は 合計2回以内)
		アブラムシ類 コガ アムシ ハマダラミカガ	50~ 100倍	セリ成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット1 冊 (30×60 cm・ 使用土壌 約3L) 当り 0.5L	定植前日 ~ 定植時	1回	灌注	

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
レタス 非結球レタス	—	アブラムシ類	2000～ 3000 倍	100～300 L/10a	収穫3 日 前まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (は種前の培土混和 は 1 回以内、 育苗期の株元散 布、定植時の土壌 混和及び育苗トレイ への灌注は合計 1 回以内、散布及び 無人航空機散布は 合計 2 回以内)
		ハモンヨトウ	50 倍	セロ型育苗 トレイ 1 箱 または ペーパーポット 1 冊 (30×60 cm・ 使用土壌 約1.5～4.0L)当 り 0.5L	定植前日 ～ 定植時	1 回	灌注	
		アブラムシ類 ナメタリバエ	50～ 100 倍					
非結球あぶらな科 葉菜類 (チゲンサイ、 畑わさびを 除く) かぶ		アブラムシ類	3000 倍	100～300 L/10a	収穫3 日 前まで	2 回 以内	散布	3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布は 2 回以内)
		キジノミムシ	2000 倍					3 回以内 (は種時及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
		アブラムシ類	3000 倍					
		キジノミムシ	2000 倍					
		アブラムシ類 ナメタリバエ			畑育 苗期	3 回 以内		3 回以内
だいこん		アブラムシ類	2000～ 3000 倍	100～300 L/10a	収穫7 日 前まで	2 回 以内	散布	5 回以内 (は種時の播種土壌混 和は 1 回以内、は種時 の全面土壌混和は 1 回 以内、粒剤の散布は 1 回以内、水溶液の散 布、液剤の散布及び 無人航空機散布は 合計 2 回以内)
		ダイコンハムシ	2000 倍					
		キジノミムシ	1000 倍					
ルン		アブラムシ類	3000 倍		収穫3 日前 まで	3 回 以内		3 回以内

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
ねぎ	—	アザミヤ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日前 まで	2回 以内	散布	4回以内 (1は種時の土壌混和、 育苗トレイへの灌注及び 定植時の株元散布は 合計1回以内、 生育期の株元灌注は 1回以内、散布、無人 航空機散布及び定植 後の株元散布は 合計2回以内)
		アザミヤ類 ハモグリバエ類 シイロミゾウ タバエ サカカ	50倍	セキ成型育苗 トレイ1箱 または ペーパーポット1冊 (30×60 cm・ 使用土壌 約1.5~4.0L) 当り0.5L	定植前日 ～ 定植時	1回	灌注	
		カバサコバエ類	1000倍	1L/m ²	生育期 但し、 収穫4日 前まで		株元 灌注	
		アザミヤ類						
		ハモグリバエ類 トビイロツグザムシ						
たまねぎ	—	アザミヤ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	3回 以内	散布	4回以内 (定植時の灌注は1回以 内、 散布は3回以内)
		ハモグリバエ類	50倍	セキ成型育苗 トレイ1箱又は ペーパーポット1冊 (30×60cm・ 使用土壌約 1.5~4.0 L) 当り0.5 L	定植前日 ～ 定植時	1回	灌注	
にら	—	ササアザミヤ	400倍	0.4L/m ²	生育期 但し、 収穫4日 前まで	1回	株元 灌注	3回以内 (生育期の株元 灌注は1回以内、 散布は2回以内)
		ササアザミヤ アブラムシ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫 前日まで	2回 以内	散布	
		カバサコバエ類	1000倍	1L/m ²	生育期 但し、 収穫4日 前まで	1回	株元 灌注	
わけぎ	—	アザミヤ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日前 まで	2回 以内	散布	4回以内 (定植後の株元散布は 1回以内、生育期の株 元灌注は1回以内、 散布は2回以内)
		アザミヤ類 ハモグリバエ類	400倍	0.4L/m ²	生育期 但し、 収穫4日 前まで	1回	株元 灌注	

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
アスパカス	—	コジラミ類 アザミヤ類 カミシ類 ジュウボノヒガハシ	2000倍	100~800 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
らっきょう		アザミヤ類		100~300 L/10a	収穫7日前 まで			(粒剤は2回以内、 液剤、水溶液及び水和 剤は合計3回以内)
さとうきび		アブラミ類 カンジャコバネガカミシ サトウハチバナアザミヤ				100~300 L/10a	収穫7日前 まで	
にんじん		アブラミ類	400倍	0.4L/m ²	生育期 但し、収穫 21日前まで			1回
		トビイロヨウタノザウル クハバネノコハエ類						
セラー		アブラミ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日前 まで	2回 以内	散布	3回以内 (1回播種時の土壌混和は 1回以内、散布は 2回以内)
ほうれんそう	アブラミ類 ウリハミトキ	3000倍	収穫前日 まで					3回以内 (1回播種時の土壌混和は 1回以内、散布は 2回以内)
しゅんぎく	アブラミ類		3回以内 (1回播種時及び定植時の 土壌混和は合計1回以 内、散布は 2回以内)					
みつば	—	アブラミ類	3000倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで 但し、伏 せ込み栽 培は伏せ 込み前ま で	2回 以内	散布	2回以内
だいず		カミシ類 ダイズサタハエ	2000倍		収穫7日 前まで			3回 以内
あずき		フタズビハミシ	3000倍					
		アブラミ類						3回以内

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
豆類(未成熟、 ただし、えだま め、さやいんげ ん、さやえんどう、 実えんどう、未成熟さ げ、未成熟そら まめを除く)	—	アブラムシ類 ハゲリバエ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫7日 前まで	2回 以内	散布	2回以内
えだまめ		カミシ類 ダイササガエ アブラムシ類 ハゲリバエ類			3000倍			3回以内 (1回時の土壌混和は 1回以内、散布、空中 散布、無人航空機散布 は合計2回以内)
未成熟ささげ		アブラムシ類 ハゲリバエ類	2回以内					
さやいんげん		アブラムシ類 ハゲリバエ類 コジラネ類 カミシ類	収穫前日 まで		3回以内 (株元散布は1回以内、 散布は2回以内)			
さやえんどう 実えんどう		アブラムシ類 ハゲリバエ類 ウナジミ カミシ類	3回以内 (株元散布は1回以内、 散布は2回以内)					
未成熟そらまめ		アブラムシ類 ハゲリバエ類 カミシ類	収穫7日 前まで		2回以内			
しょうが		—	クハネ科/コバエ類		2000倍			100~300 L/10a
わら	アブラムシ類 フタエトビリ/ヒメコバイ		収穫7日 前まで	2回以内				
はらひいしょ	ワケアブラムシ		収穫3日 前まで	1回		1回		
かんしよ	コジラネ類 アブラムシ類		収穫7日 前まで	3回 以内		3回以内		
せり	水田	アブラムシ類	収穫3日 前まで					
せり (水耕栽培)	ガラス室等 の施設	アブラムシ類	収穫3日 前まで	2回 以内		2回以内		
すいぜんじな	—	アブラムシ類	収穫3日 前まで					
もへや		アゲハシカ類	収穫前日 まで					
なんてん (葉)		アブラムシ類	収穫7日 前まで				3回以内 (土壌表面散布は 1回以内、 散布は2回以内)	
ふき		コジラネ類						

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
りんご	—	アブラムシ類 モモハゲリガ シクムシ類 ギンモハゲリガ コカガラムシ類 カミシ類	2000倍	200~700 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内
もも 初刈り		アブラムシ類 モモハゲリガ シクムシ類 カミシ類 モモツツリゾウムシ				2回 以内		2回以内
おうとう		オオムシヨウジヨウバエ カミシ類				3回 以内		3回以内
なし		アブラムシ類 シクムシ類 カミシ類 ケムシ類 コカガラムシ類 チュウゴクシジミ				4回以内 (塗布は 1回以内、散布 及び無人航空機 散布は合計 3回以内)		4回以内 (塗布は 1回以内、散布 及び無人航空機 散布は合計 3回以内)
かき		カミシ類 コカガラムシ類 タノハムシガ アザシメ類				3回 以内		3回以内
ぶどう	—	フタトヒメヨコバイ	3000倍	200~700 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内 (塗布は1回以内)
		カミシ類 ブドウカサシ	2000倍			2回 以内		2回以内
ラズベリー		チャキロアザシメ コカガラムシ類	1000~ 2000倍			3回 以内		3回以内
		アザシメ類	2000倍			3回 以内		3回以内
		チャキロアザシメ コカガラムシ類	1000~ 2000倍			3回 以内		3回以内
		ゴマダカサシ	1000倍			3回 以内		3回以内
かんきつ		アブラムシ類 シカンハゲリガ カミシ類 ゴキウサメグリ ゲキス類 シカンバエ アサカカガラムシ ヤノコカガラムシ サンホセカガラムシ シカンギミ コジラシ類 チャミドリヒメヨコバイ アサバロト	2000倍			3回 以内		3回以内
小粒核果類		アブラムシ類 カミシ類 シクムシ類 モミヒメヨコバイ						

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジメチアノンを 含む農薬の 総使用回数	
イチゴ	—	かみ類	1000~2000倍	200~700 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	3回以内	
マンゴー		チャノトリ、シマ	2000倍		収穫前日 まで	2回 以内		2回以内	
びわ		かみ類 ビロシラ			収穫前日 まで				
あけび (果実)		かみ類			収穫前日 まで				
かりん				収穫前日 まで					
かりん(葉)		チャノトリ チャノトリ、シマ、コバエ チャノトリ、シマ ツグミ、オオカミカメ コシノボリ、ラムシ	200~400 L/10a	摘採7日 前まで					
茶									
てんさい	—	アブラムシ類 テオヤイトトリ、ハナバエ	2000~3000倍	100~300 L/10a	収穫7日 前まで	2回 以内	散布	3回以内 (灌水は1回以内、 散布は2回以内)	
		カメノコ、ハムシ	1000~2000倍						
		カメノコ、ハムシ テオヤイトトリ、ハナバエ テオヤイトトリ、ハムシ	100~ 200倍	5L/ペーパー ポット6冊 (2.5L/m ²)	移植前	1回	灌注		
		アブラムシ類 テオヤイトトリ、ハナバエ テオヤイトトリ、ハムシ	100~ 240倍	6L/ペーパー ポット6冊(3 L/m ²)					
かんきつ (苗木)		シロカキ	50倍	100mL/株	育苗期	5回 以内	株元 灌注	5回以内	
えごま(種子)		かみ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫3日 前まで	5回 以内	散布	5回以内	
アサガオ(茎葉) しそ(花穂) しそ科葉菜類 (しそ、バジル を除く)		アブラムシ類	3000倍			2回 以内		2回以内	2回以内
しそ		アブラムシ類 ウハムシ、トビ							3回以内 (定植時の土壌混和は1回 以内、散布は2回以内)
バジル しよくようほう ずき 食用コナラ 食用カーネーション 食用パセリ 食用金魚草 食用トウモロコシ 食用なでしこ 食用リム 食用オクラ 食用せんじょう こう		アブラムシ類 コナラ類							2回以内
食用トウモロコシ									
						収穫7日 前まで			

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
食用ぎく	—	アブラムシ類 コジロアミ類	3000倍	100-300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	4回以内 (定植時の土壌混和は 1回以内、散布及び株元 散布は合計3回以内)
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)		アブラムシ類 コジロアミ類	2000～ 3000倍		発生 初期	5回 以内	散布	5回以内 (土壌混和は1回以内)
きく		ハダニ類	1000倍	1 L/m ²			灌注	
		アブラムシ類 コジロアミ類	2000～ 3000倍	100-300 L/10a			散布	
		カミシ類	2000倍				散布	
		ハダニ類	1000～ 2000倍	1 L/m ²			灌注	
樹木類 (つじ類 つばき類を 除く)		カミシ類	2000倍	100-700 L/10a	発生 初期	5回 以内	散布	5回以内
つじ類		ツツゲンバイ カミシ類		100-300 L/10a				
つばき類		カミシ類		100-700 L/10a				2回 以内
			チャドカス	100倍	0.5-2L/樹 【但し、220 L/10a まで】			
いぐさ			イグサシロアミ	1000倍	100-150 L/10a	発生 初期	散布	2回以内
いよれ牧草			アブラムシ類	2000倍	100-300 L/10a	収穫7日 前まで		3回 以内

作物名	適用病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジレファンを 含む農薬の 総使用回数
かき	コカハダシロアミ類	20~40 g/樹	発芽前~ 発芽期	1回	本剤1g 当り水1mL の割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いた部分に塗布する。	4回以内 (塗布は1回以内、 散布及び無人航空機散布 は合計3回以内)
ぶどう	クダアサガハ	40 g/樹	幼果期まで 但し、収穫30 日前まで			3回以内 (塗布は1回以内)

(2) わさび用緑風 SG

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
わさび	アブラムシ類 アザミウマ類	2000 倍	100~200 L/10 a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内

4. 登録番号 20814 : スタークル粉剤 DL、
登録番号 20815 : アルバリン粉剤 DL、
登録番号 20816 : ホクコースタークル粉剤 DL、
登録番号 20962 : 三井東圧アルバリン粉剤 DL
(ジノテフラン 0.50 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イナゴ類 イネトヨイムシ ニカメイチュウ フタホヒコヤガ	3 kg/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び 側条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、 空中散布、無人航空機 散布は合計 3 回 以内)
だいず えだまめ	カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤマハエ			2 回 以内		3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布、空中 散布、無人航空機散布 は合計 2 回 以内)

5. 登録番号 20836 : スタークルトレボン粉剤 DL

(エトフェンプロックス 0.30 %・ジノテフラン 0.50 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 カメムシ類 イナゴ類 ニカメイチュウ	3 kg/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内)

6. 登録番号 21025 : ホクコーラブサイドスタークル粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・フサライド 2.5 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内)	3 回以内
	イナゴ類 ニカメイチュウ	4 kg/10 a					

7. 登録番号 21027 : ビームスタークル粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメムシ類 イナゴ類	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理は 1 回以内、本田では 3 回以内)
	穂枯れ(ごま葉枯病菌)	4 kg/10 a					

8. 登録番号 21191 : ビームバシスタークル粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・メプロニル 3.0 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	メプロニルを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメシ類 イナゴ類	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、本 田での散布、空中 散布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、本田 では 3 回以内)	3 回以内
	穂枯れ(ごま 葉枯病菌) 紋枯病	4 kg/10 a						

9. 登録番号 21228 : 側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤

(ジノテフラン 4.0 %・プロベナゾール 48.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時 期	本剤の 使用回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 イネミズゾウムシ イネトビロイシ ウンカ類	500 g/10 a	移植時	1 回	ペースト肥料 に混合し 側条施肥 田植機で 施用す る。	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は合 計 1 回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	2 回以内 (移植時までの 処理は 1 回 以内)

10. 登録番号 21248 : スタークル L 粉剤 DL、

登録番号 21435 : スタークルメイト L 粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	3 kg/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以 内、 本田での散布、空中散 布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)
	カメシ類	3~4 kg/10 a				

1 1. 登録番号 21259 : スタークル液剤 10、
登録番号 21260 : スタークルメイト液剤 10、
登録番号 24582 : アルバリン液剤 10
(ジノテフラン 10.0 %液剤)

(1) スタークル液剤 10 及びスタークルメイト液剤 10

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数		
稲	ウカ類	30 倍	3L/10a	収穫7日 前まで	3回 以内	無人航空機 による散布	4回以内 (育苗箱への処理及び側条施 用は合計1回以内、 本田での散布、空中散布、無人 航空機散布は合計3回以内)		
		16 倍	1.6L/10a			散布			
	ツマグロヨコバイ	1000 倍	60~150 L/10a					無人航空機 による散布	
		300 倍	25L/10a			空中散布			
		ウカ類 カミシ類	8 倍						0.8L/10a
			30 倍						3L/10a
小麦	アブラムシ類	1000 倍	60~150 L/10a	2回 以内	散布		2回以内		
		8 倍	0.8 L/10 a		無人航空機 による散布				
だいこん	アブラムシ類	8~16 倍	1.6L/10a	収穫3日 前まで	2回 以内	無人航空機 による散布	5回以内 (は種時の播種土壌混和は1 回以内、は種時の全面土壌 混和は1回以内、粒剤の散 布は 1回以内、水溶剤の散布、 液剤の散布及び無人航空機 散布は合計2回以内)		
キャベツ						3回以内 (育苗期の株元散布、定植 時の土壌混和及び灌水は合 計1回以内、散布及び無人 航空機散布は合計2回以 内)			
ブロッコリー	アブラムシ類	8~16 倍	1.6L/10a	収穫3日 前まで	2回 以内	無人航空機 による散布	3回以内 (定植時の土壌混和及び灌 注は合計1回以内、散布及 び無人航空機散布は合計2 回以内)		
ねぎ	アブラムシ類	10~16 倍	1.6L/10a	収穫3日 前まで	2回 以内	無人航空機 による散布	4回以内 (は種時の土壌混和、育苗ト レイへの灌水及び定植時の株 元散布は合計1回以内、生 育期の株元灌水は1回以 内、散布、無人航空機散布 及び定植後の株元散布は合 計2回以内)		

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジメチアを含む農薬の 総使用回数
さとうきび	カンショコバネガカ ムシ イモ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫7 日 前まで	3 回 以内	散布	5 回以内 (粒剤は2 回以内、液剤、 水溶剤及び水和剤は合計 3 回以内)
		14 倍	24 L/10a			無人航空機 による散布	
だいず えだまめ	カミシ類 フタズビカミシ ダイズサヤマバエ	1000 倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	2 回 以内	散布	3 回以内 (は種時の土壌混和は1 回 以内、 散布、空中散布、無人航空 機散布は 合計2 回以内)
		8 倍	0.8L/10a			無人航空機 による散布	
						空中散布	
らっきょう	アザミ類 ハモグリバエ類		1.6L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	無人航空機 による散布	3 回以内
いね牧草	アブラムシ類	1000 倍	100~300 L/10a	収穫7 日 前まで		散布	
かんしょ	アブラムシ類	8~16 倍	1.6 L/10 a	収穫3 日 前まで	1 回	無人航空機 による 散布	1 回
はくさい					2 回 以内		3 回以内 (定植時の土壌混和及 び灌注は合計1 回以 内、散布及び無人航空 機散布は合計 2 回以内)
レタス 非結球レタス							4 回以内 (は種前の培土混和は 1 回以内、育苗期の株 元散布、定植時の土壌 混和及び育苗トレイへの 灌注は合計1 回以内、 散布及び無人航空機 散布は合計2 回以内)
かき	カメシ類	20 倍	8 L/10 a	収穫前 日まで	3 回 以内		4 回以内 (塗布は1 回以内、散布 及び無人航空機散布 は合計 3 回以内)

(2) アルバリン液剤 10

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍率	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジネフランを含む 農薬の総使用回数
小麦	アブラムシ類	8 倍	0.8 L/ 10 a	収穫 7 日 前まで	2 回 以内	無人航 空機に よる散 布	2 回以内
だいこん	アブラムシ類	8~16 倍	1.6 L/10 a	収穫 7 日 前まで			5 回以内 (は種時の播溝土壌混和 は 1 回以内、は種時の全 面土壌混和は 1 回以内、 粒剤の散布は 1 回以内、 水溶剤の散布、液剤の散 布及び無人航空機散布は 合計 2 回以内)
キャベツ				収穫 3 日 前まで			3 回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び灌 注は合計 1 回以内、散布 及び無人航空機散布は 合計 2 回以内)
ブロッコリー							3 回以内 (定植時の土壌混和及び 灌注は合計 1 回以内、 散布及び無人航空機散布 は合計 2 回以内)
ねぎ	アザミウマ類	10~16 倍	1.6 L/10 a	4 回以内 (は種時の土壌混和、 育苗トレイへの灌注及び 定植時の株元散布は合計 1 回以内、生育期の株元 灌注は 1 回以内、散布、 無人航空機散布及び定植 後の株元散布は合計 2 回以内)			
かんしょ	アブラムシ類	8~16 倍		1.6 L/10 a	1 回		1 回
はくさい					3 回 以内		3 回以内 (定植時の土壌混和及び灌 注は合計 1 回以内、散布及 び無人航空機散布は 合計 2 回以内)
レタス 非結球レタス							4 回以内 (は種前の培土混和は 1 回 以内、育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 育苗トレイへの灌注は合計 1 回以内、散布及び無人航 空機散布は合計 2 回以内)
かき	カミシ類	20 倍	8 L/10 a	収穫前日 まで	3 回 以内		4 回以内 (塗布は 1 回以内、散布及び 無人航空機散布は 合計 3 回以内)

1 2. 登録番号 21276 : スタークル 1 キロ H 粒剤、
登録番号 21277 : スタークルメイト 1 キロ H 粒剤
(ジノテフラン 3.0 % 粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類 イネミズゾウムシ ニカメイチュウ	1 kg/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内)
					無人航空機による散布	

1 3. 登録番号 21496 : ビルダースタークル箱粒剤、
登録番号 21497 : ホクコービルダースタークル箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 % 粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネトヨイシ ニカメイチュウ イネミズゾウムシ もみ枯細菌病 白葉枯病	育苗箱 (30×60×3 cm) 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植 3 日前~移植当日	1 回	育苗箱の苗の上から均一に散布する	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内)	2 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内)
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネコカメシ いもち病		緑化期~移植当日				

1 4. 登録番号 21607 : スタークルエアー50、
登録番号 21608 : スタークルメイトエアー50、
登録番号 24012 : ファームスター顆粒水溶剤 50
(ジノテフラン 50.0 % 水溶剤)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	散布液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	カメシ類 ウンカ類	40 倍	0.8 L/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	無人ヘリコプターによる散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計 3 回以内)
						空中散布	

1 5. 登録番号 21710 : ホクコーラブサイドスタークルフロアブル
(ジノテフラン 5.0 %・フサライド 12.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回 数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 カメシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	500 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、 本田での散布、 空中散布、無人ヘ リコプターによる 散布は合計 3 回 以内)	3 回以内
	いもち病 カメシ類	150 倍	25 L/10 a			無人ヘリコ プターによる散布		
	いもち病 カメシ類 ウンカ類	4 倍	0.8 L/10 a			空中散布		
		原液	0.2 L/10 a					

1 6. 登録番号 21801 : ワイドナーエース粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・ブプロフェジン 1.0 %・フサライ
ド 2.5 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
稲	紋枯病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメシ類 コブノメイガ コメイチユ イネツトムシ フタホシコヤカ いもち病	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布

ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	テブフェノジドを 含む農薬の 総使用回数	ブプロフェジンを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数	フルトラニルを 含む農薬の 総使用回数
4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以 内、本田での散布、空 中散布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	2 回以内	4 回以内 (小包装投入 は 1 回以内)	3 回以内	3 回以内 (小包装投入 は 1 回以内)

17. 登録番号 21871：コラトップスタークル1キロ粒剤
(ジノテフラン 5.0 %・ピロキロン 15.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	ピロキロンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメシ類 ツマグロヨコバイ	1 kg/10 a	出穂 5 日前まで	2 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内)	3 回以内 (直播での種時又は移植時までの処理は 1 回以内、本田では 2 回以内)
					無人航空機による散布		

18. 登録番号 21886：イモチエーススタークル粒剤、
登録番号 21888：ホクコーイモチエーススタークル粒剤
(ジノテフラン 1.67 %・メトミノストロビン 4.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	メトミノストロビンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 変色米(アルタナリア菌) 変色米(カーブナリア菌) 墨黒穂病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 カメシ類 フタオビコヤカ	3 kg/10 a	収穫 35 日前まで	1 回	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人機散布は合計 3 回以内)	1 回

19. 登録番号 21975：トレボンスター粉剤 DL
(エトフェンプロックス 0.40 %・ジノテフラン 0.20 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	コメイチユ コブノメカ フタオビコヤカ	4 kg/10 a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施用は合計 1 回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計 3 回以内)
	ウンカ類 カメシ類 ツマグロヨコバイ						
だいず	カメシ類 フタジヒメハシ	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前まで	2 回以内		2 回以内	3 回以内 (は種時の土壌混和は 1 回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計 2 回以内)

20. 登録番号 22036 : ビームエイトスタークルゾル

(ジノテフラン 10.0 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は合 計 1 回以内、本田 での散布、空中散 布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、本田 では 3 回以内)
		250~300 倍	25 L/10 a					
		8 倍	0.8 L/10 a			無人ヘリコプ ターによる 散布		

21. 登録番号 22037 : トレボンスターフロアブル

(エトフェンプロックス 7.0 %・ジノテフラン 3.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の 総使用回数	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲	カメシ類 ウンカ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ フタホシコヤガ	1000 倍	60~ 150 L/10 a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布	3 回以内	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、 本田での散布、 空中散布、無人 航空機散布は合 計 3 回以内)
	カメシ類	300 倍	25 L/10 a					
	カメシ類 ウンカ類 コブノメイガ ツマグロヨコバイ							
だいず	カメシ類	8 倍	0.8 L/10 a		2 回以内	無人航空 機による 散布	2 回以内	3 回以内 (は種時の土壌混 和は 1 回以内、 散布、空中散 布、無人航空機 散布は合計 2 回 以内)

2 2. 登録番号 22063 : 日農ビームアプロードスタークル粉剤 5 DL、

登録番号 22064 : クミアイビームアプロードスタークル粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.0 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	ブプロフェジンを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ いもち病	3~4 kg/10 a	収穫 14 日 前まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、空中 散布、無人ヘリ 散布は 合計 3 回以内)	4 回以内 (小包装投入は 1 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、 本田では 3 回以内)

2 3. 登録番号 22102 : ビームモンセレンスタークル粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	ペンシクロンを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4 kg/10 a	収穫 21 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、本田 での散布、空中 散布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、本田 では 3 回以内)	4 回以内

2 4. 登録番号 22180 : サジェスト微粒剤 F

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉粒剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	ペンシクロンを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4 kg/10 a	収穫 21 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び 側条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、 空中散布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、本田 では 3 回以内)	4 回以内

25. 登録番号 22268 : ビームモンカットスタークル F 粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	フルトラニルを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前 まで	3 回以 内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以 内、本田での散布、空 中散布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、本 田では 3 回以内)	3 回以内 (小包装投 入は 1 回以 内)

26. 登録番号 22332 : スタークル豆つぶ、

登録番号 22333 : クミアイスタークル豆つぶ、

登録番号 22495 : スタークルメイト豆つぶ

(ジノテフラン 12.0 %剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジノテフランを含む 農薬の総使用回数
稲	カメシ類 イネミズゾウムシ イネトノヨイモシ	250 g/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以内、 本田での散布、空中散布、 無人航空機散布は合計 3 回以内)
	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	250~500 g/10 a				

27. 登録番号 22416 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤、

登録番号 22417 : 明治 Dr. オリゼスタークル箱粒剤、

登録番号 23950 : オリザエートスター箱粒剤

(ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 25.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 ウンカ類 イネミズゾウムシ イネトノヨイモシ ツマグロヨコバイ コメイチエウ イネカサネ もみ枯細菌病 白葉枯病	育苗箱 (30×60×3 cm 使用 土壌約 5 L)1 箱当 り 50 g	緑化期~ 移植当日	1 回	育苗箱の 苗の上か ら均一に 散布する。	4 回以内 (育苗箱への処 理及び側条施 用は合計 1 回 以内、本田での 散布、空中散 布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以 内)	2 回以内 (移植時まで の処理は 1 回以内)
	フタホビコヤガ		移植 3 日前~ 移植当日				

28. 登録番号 22426 : ビームスタークル微粒剤 F

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉粒剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び 側条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、 空中散布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理は 1 回以内、本田では 3 回以内)

29. 登録番号 22479 : ダブルカットスタークル粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.11 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	カスガマイシンを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4 kg/10 a	穂揃 期 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計 1 回以内、本田 での散布、空 中散布、無人 ヘリ散布は合計 3 回以内)	4 回以内 (種子浸漬は 1 回以内、育 苗箱への処 理は 1 回以 内、本田で は 2 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処 理は 1 回以 内、本田では 3 回以内)
	ニカメイチュウ イナゴ類	4 kg/10 a						

30. 登録番号 22642 : ホクコートップジンスタークル粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・チオファネートメチル 2.0 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 紋枯病	3~4 kg/10 a	収穫 14 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び 側条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、 空中散布、無人ヘリ散布 は合計 3 回以内)	3 回以内 (種子への処理は 1 回以内)

3 1. 登録番号 22660 : MIC ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤

(クロラントラニプロール 0.75 %・ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %
粒剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	クロラントラニプロールを 含む農薬の 総使用回数	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを 含む農薬の総 使用回数
稲 (箱育苗)	白葉枯病 もみ枯細菌病 イネミズウムシ イネトヨイムシ ニカメイチュウ フタホシコヤカ イネツトムシ	育苗箱 (30×60×3 cm、使 用土壌 約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植 3 日前 ～ 移植 当日	1 回	育苗 箱の 上か ら均 一に 散布 する。	1 回	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側 条施用は合 計 1 回以 内、本田で の散布、空 中散布、無 人ヘリ散布は 合計 3 回以 内)	2 回以内 (移植時まで の処理は 1 回以内)
	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメカ		緑化期 ～ 移植 当日					

3 2. 登録番号 22661 : クミアイアプロードスタークルゾル、

登録番号 22662 : アプロードスタークルゾル

(ジノテフラン 9.0 %・ブプロフェジン 18.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	ブプロフェジンを 含む農薬の 総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は合 計 1 回以内、本田 での散布、空中散 布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	4 回以内 (小包装投入は 1 回以内)
		8 倍	0.8 L/10 a			無人ヘリコプタ ーによる散 布		

3 3. 登録番号 22725：キックオフ顆粒水和剤

(クロラントラニプロール 4.0 %・ジノテフラン 15.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	カウントアップ ロールを 含む農薬の 総使用回数	ジリアンを 含む農薬の 総使用回数
なし	カミシ類 コナカイラムシ類	2000 倍	200~700 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内	3 回以内
もも	シクシ類 カミシ類 ハマシ類 モモガキ			収穫3 日前 まで	2 回 以内		2 回以内	
初刈	カミシ類 カミシ類			収穫14 日前 まで	3 回 以内		3 回以内	
うめ	カミシ類 カミシ類			収穫前日 まで				
かき	コナカイラムシ類 ハマシ類 カミシ類 アザシ類 カミシ類		100~300 L/10a	収穫30 日前 まで	3 回 以内		4 回以内 (粒剤は1 回 以内、水和剤 は3 回以内)	5 回以内 (粒剤は2 回以内、 液剤、水溶吸び 水和剤は合計3 回 以内)
さとうきび	カシコバネカミシ サトウキビアザシ アザシ アザシ類 アザシ類 メチユ類 アザシ類							
キャベツ	アザシ類 アザシ類 コナ アザシ ヨウモシ ハモシ ハマシ ハイマダラムシ	100 倍	セロ成型育苗 トレイ1 箱 または ペーパーポット 1 冊(30×60 cm・ 使用土壌 約1.5~4.0L) 当り 0.5L	定植前日 ～ 定植時	1 回	灌注	4 回以内 (定植時まで の処理は1 回 以内、定植後 の処理は3 回以内)	3 回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和 及び灌注は合計1 回 以内、散布及び 無人航空機散布は 合計2 回以内)
はくさい	アザシ類 コナ アザシ ヨウモシ ハマシ ハイマダラムシ							3 回以内 (定植時の土壌混 和及び灌注は合計 1 回以内、散布及 び無人航空機散布 は合計 2 回以内)
ブロッコリー	アザシ類 コナ アザシ ハモシ ヒメギ コンバエ							3 回以内 (定植時の土壌混和 及び灌注は合計 1 回以内、散布及 び無人航空機散布は 合計2 回以内)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを含む農薬の 総使用回数	ジノテフランを含む 農薬の総使用回数
レタス	アブラムシ類 材ハダカ ガテアガ ハダカバエ ハダカヨトウ	100 倍	セル成型育苗 トレイ 1 箱または ペーパーポット 1 冊 (30×60cm・ 使用土壌 約1.5-4.0L) 当り 0.5L	定植前日 ～ 定植時	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回 以内、定植後 の処理は 3 回以内)	4 回以内 (は種前の培土混和 は 1 回以内、育苗期 の株元散布、定植時 の土壌混和及び育苗 トレイへの灌注は合計 1 回以内、散布及び 無人航空機散布は 合計 2 回以内)
非結球レタス							4 回以内 (灌注は 1 回 以内、散布は 3 回以内)	
ねぎ	ハダカバエ類 アザミヤカ類 シロイモリヨトウ コバネナガバエ類						4 回以内 (灌注は 1 回 以内、定植後の 処理は 3 回以内)	4 回以内 (は種時の土壌混 和、育苗トレイへの灌 注及び定植時の株元 散布は合計 1 回以 内、生育期の株元灌 注は 1 回以内、散 布、無人航空機散布 及び定植後の株元 散布は合計 2 回以内)

3 4. 登録番号 22784 : アプロードモンカットスタークル F 粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.5 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	ブプロフェジンを 含む農薬の 総使用回数	フルトラニルを 含む農薬の 総使用回数
稲	紋枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4 kg/10 a	収穫14日 前まで	3回 以内	散布	4回以内 (育苗箱への処理及び 側条施用は合計1回以 内、本田での散布、 空中散布、無人ヘリ散 布は合計3回以内)	4 回以内 (小包装投入は 1回以内)	3 回以内 (小包装投入は 1回以内)

3 5. 登録番号 22924 : ホクコートップジンスタークルフロアブル

(ジノテフラン 5.0 %・チオファネートメチル 20.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 墨黒穂病 稲こうじ病 ウカ類	500 倍	60~150 L/10 a	収穫 14 日 前まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理 及び側条施用は 合計 1 回以内、本 田での散布、空中 散布、無人航空機 散布は合計 3 回 以内)	3 回以内 (種子への処理は 1 回以内)
	カメムシ類 ツマグロヨコバイ	150 倍	25 L/10 a					
	いもち病 紋枯病 カメムシ類 ウカ類	4 倍	0.8 L/10 a			無人航空 機による 散布		
		15 倍	3 L/10 a			空中 散布		

3 6. 登録番号 22981 : ダブルカットバリダスタークル粉剤 3 DL

(ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリ
ダマイシン 0.30 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 もみ枯細菌病 ウカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4 kg/10 a	穂揃期 まで	2 回 以内	散布
	ニカメイチュウ	4 kg/10 a			

ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	カスガマイシンを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数	バリダマイシンを 含む農薬の 総使用回数
4 回以内 (育苗箱への処理及び側条施 用は合計 1 回以内、本田で の散布、空中散布、 無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	4 回以内 (種子浸漬は 1 回以内、育苗 箱への処理は 1 回以内、本 田では 2 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理は 1 回以内、本田では 3 回以内)	6 回以内 (育苗箱灌注は 1 回以内、本田では 5 回以内)

37. 登録番号 22995 : ダブルカットスタークルフロアブル

(ジノテフラン 10.0 %・カスガイシン 1.37 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	カスガイシンを 含む農薬の 総使用回数	トリシクラゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 もみ枯細菌病 ウカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類	1000 倍	60~150 L/10 a	穂揃期 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱へ の処理及 び側条施 用は合計 1 回以内、本 田での散 布、空中散 布、無人航 空機散布は 合計 3 回 以内)	4 回以内 (種子浸漬は 1 回以内、 育苗箱への 処理は 1 回 以内、本田 では 2 回以 内)	4 回以内 (育苗箱への 処理は 1 回 以内、本田 では 3 回以 内)
		300 倍	25 L/10 a			無人航 空機に よる 散布			
		8 倍	800 mL/10 a			空中 散布			

38. 登録番号 23074 : アトラクトン箱粒剤、

登録番号 23075 : スターダム箱粒剤

(ジノテフラン 12.0 %粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	カメシ類	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植当日	1 回	育苗箱 の上から 均一に 散布す る。	4 回以内 (育苗箱への処理及 び側条施用は合計 1 回以内、本田での 散布、空中散布、 無人航空機散布は 合計 3 回以内)
		高密度には種する 場合は 1 kg/10 a (育苗箱(30×60×3 cm、 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50~100 g)	移植 3 日前 ~ 移植当日			
	ウカ類 イナゴ類 イネミズゾウムシ イネトヨイムシ イネカサバエ フタホシコヤガ ニカメイチュウ	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g				

39. 登録番号 23076 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、
登録番号 23077 : 明治 Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、
登録番号 23078 : ロングリーチ箱粒剤
(ジノテフラン 12.0 %・プロベナゾール 24.0 %粒剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	カメシ類	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植 当日	1 回	育苗箱の 苗の上か ら均一に 散布する。	4 回以内 (育苗箱への 処理及び 側条施用は 合計 1 回以 内、本田での 散布、空中散 布、無人ヘリ散 布は合計 3 回 以内)	2 回以内 (移植時まで の処理は 1 回 以内)
	ウンカ類 イネシジミ類 イネノメイガ ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ イネカサネ イネハダニ イモチ病		移植 3 日 前～移植当 日				

40. 登録番号 23113 : イッカツエース粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシク
ラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %粉剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法
稲	いもち病 紋枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 内穎褐変病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメシ類 コブノメイガ フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネツトムシ	3~4 kg/10 a	穂揃期まで	2 回以内	散布

ジノテフランを含む 農薬の総使用回数	テブフェノジドを含む 農薬の総使用回数	カスガマイシンを含む 農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む 農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む 農薬の総使用回数
4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以内、 本田での散布、空中散 布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	2 回以内	4 回以内 (種子浸漬は 1 回 以内、育苗箱への処 理は 1 回以内、本田 では 2 回以内)	4 回以内 (育苗箱への処理 は 1 回以内、 本田では 3 回以内)	6 回以内 (育苗箱灌注は 1 回以内、本田では 5 回以内)

4 1. 登録番号 23365 : フェルテラスタークル箱粒剤 CU

(クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %粒剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	クロラントラニプロールを 含む農薬の 総使用回数	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	ウカ類 イネミズゾウムシ イネトオムシ ニカメイチュウ ゴブノメイガ フタヒコガ イネトムシ	育苗箱 (30×60×3 cm、使用 土壌約5 L) 1箱当り 50 g	は種前	1回	育苗箱の 床土又は覆土 に均一に混和 する。	1回	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計 1回以内、 本田での散 布、空中散布、 無人航空機散 布は合計 3回以内)
		高密度こぼ種 する場合は1 kg/10a (育苗箱30×60×3 cm、 使用土壌約5 L) 1箱当り 50~100 g)					
		育苗箱 (30×60×3 cm、使用 土壌約5 L) 1箱当り 50 g	移植3日前 ～ 移植当日		育苗箱の 上から 均一に 散布する。		
	ツマグロヨコバイ イネカサネシ イネコバ類	高密度こぼ種 する場合は1 kg/10a (育苗箱30×60×3 cm、 使用土壌約5 L) 1箱当り 50~100 g)					

4 2. 登録番号 23370 : スケルカット顆粒水和剤、

登録番号 23371 : スケルノック顆粒水和剤

(ジノテフラン 40.0 %水和剤)

(1) スケルカット顆粒水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
りんご	コナカイラムシ類	2000 倍	200~700 L/10 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	シツメイシ類	2000~4000 倍					

(2) スケルノック顆粒水和剤

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
りんご	コナカイラムシ類	2000 倍	200~700 L/10 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内

4 3. 登録番号 23372 : スターガードプラス AL

(ジノテフラン 0.010 %・ペンチオピラド 0.010 %水和剤)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	ペンチオピラトを 含む農薬の 総使用回数
なす	うどんこ病 アブラムシ類 コナジラミ類	原液	収穫 前日 まで	2 回 以内	散布	3 回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 定植時の株元散布は 合計 1 回以内、散布及び 定植後の株元散布は 合計 2 回以内)	3 回以内
ピーマン	うどんこ病 アブラムシ類					3 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、散布及び 定植後の株元散布は 合計 2 回以内)	
トマト ミニトマト	葉かび病 コナジラミ類					5 回以内 (育苗期の株元散布は 1 回以内、定植時の灌 注は 1 回以内、定植時の 土壌混和は 1 回以内、 散布及び定植後の株元 散布は合計 2 回以内)	
オクラ さやいんげん さやえんどう 実えんどう	アブラムシ類					3 回以内 (株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)	
きゅうり	うどんこ病 アブラムシ類 コナジラミ類 ウリハムシ		収穫 7 日前 まで			4 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、定植後の 株元散布は 1 回以内、 散布は 2 回以内)	
すいか	アブラムシ類					3 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、散布は 2 回以内)	
メロン	コナジラミ類					3 回以内 (育苗期の株元散布及び 定植時の土壌混和は 合計 1 回以内、散布は 2 回以内)	
キャベツ	アブラムシ類					3 回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 灌注は合計 1 回以内、 散布及び無人航空機 散布は合計 2 回以内)	
はくさい	アブラムシ類					3 回以内 (定植時の土壌混和及び 灌注は合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)	

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	ジメフランを 含む農薬の 総使用回数	ペントチオラトを 含む農薬の 総使用回数
ブロッコリー	アブラムシ類	原液	収穫 3 日前 まで	2 回 以内	散布	3 回以内 (定植時の土壌混和 及び灌注は 合計 1 回以内、散布及び 無人航空機散布は 合計 2 回以内)	3 回以内
レタス 非結球レタス	アブラムシ類					4 回以内 (は種前の培土混和は 1 回以内、育苗期の株元 散布、定植時の土壌混和 及び育苗トレイへの灌注は 合計 1 回以内、散布は 2 回以内)	
ねぎ	アザミウマ類 さび病					4 回以内 (は種時の土壌混和、 育苗トレイへの灌注及 び定植時の株元散布は 合計 1 回以内、 生育期の株元灌注は 1 回以内、散布、無人 航空機散布及び 定植後の株元散布は 合計 2 回以内)	4 回以内 (株元灌注は 2 回以内、散布 及び無人航空 機散布は合計 2 回以内)
豆類（未成熟、ただし、 えだまめ、さ やいんげん、 さやえんどう、実えんどう、 未成熟さ さげを除く）	アブラムシ類		収穫7 日前ま で	2 回 以内		2回以内	3回以内
えだまめ	アブラムシ類 カメムシ類		収穫7 日前ま で			3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、散布、 空中散布、無人航空機 散布は合計2回以内)	
未成熟ささげ	アブラムシ類		収穫 前日 まで			2 回以内	
かんきつ	ミカンハモグリガ		収穫 前日 まで	3 回 以内		3 回以内	
りんご	アブラムシ類、 うどんこ病						
なし	ケムシ類、 うどんこ病						
かき	コナカイガラムシ類					4 回以内 (塗布は 1 回以内、 散布は 3 回以内)	

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	ペンチブレート [®] を 含む農薬の 総使用回数
ぶどう	コナカイラムシ類、 さび病	原液	収穫 7 日前ま で	3 回 以内	散布	3 回以内 (塗布は 1 回以内)	3 回以内
うめ もも	アブラムシ類		収穫 前日 まで			3 回以内	
おうとう	カメムシ類			2 回 以内			
ばら	うどんこ病 黒星病 アブラムシ類 チュウレンジハハチ		発生 初期	3 回 以内		5 回以内 (土壌混和は 1 回以内)	
花き類・観葉 植物(ばらを除 く)	うどんこ病 アブラムシ類					5 回以内	
樹木類 (つつじ類、つ ばき類を除く)	カメムシ類 うどんこ病					5 回以内 (株元灌注は 2 回以内)	
つばき類	カメムシ類 うどんこ病					5 回以内	
つつじ類	カメムシ類 ツツジゲンバイ うどんこ病					5 回以内	

4 4. 登録番号 23405 : トライスタークル粉剤 DL、
登録番号 23407 : クミアイトライスタークル粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・テブフロキン 1.0 %粉剤)

作物名	適 用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	テブフロキンを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4 kg/10 a	収穫 14 日前まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回以内、 本田での散布、空中 散布、無人ヘリ散布は 合計 3 回以内)	2 回以内

4 5. 登録番号 23506：オールスターズプレー
(ジノテフラン 0.010 %液剤)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを含む 農薬の総使用回数
ピーマン	コナジラミ類 アザミウマ類 アブラムシ類 カメムシ類	原液	収穫前日 まで	2回 以内	希釈せず そのまま 散布する	3 回以内 (育苗期の株元散布及び定植 時の土壌混和は合計 1 回以 内、散布及び定植後の株元散 布は合計 2 回以内)
トマト ミニトマト	コナジラミ類 アブラムシ類 カメムシ類					5 回以内 (培土混和及び灌注は合計 1 回以内、育苗期の株元散布 は 1 回以内、定植時の土壌 混和は 1 回以内、散布及び 定植後の株元散布は合計 2 回以内)
なす	アザミウマ類 コナジラミ類 アブラムシ類 カメムシ類					3 回以内 (育苗期の株元散布及び定植 時の土壌混和は合計 1 回以 内、散布及び定植後の株元 散布は合計 2 回以内)
すいか	アブラムシ類		収穫7日前 まで			4 回以内 (育苗期の株元散布及び定植 時の土壌混和は合計 1 回以 内、定植後の株元散布は 1 回 以内、散布は 2 回以内)
とうがらし類	コナジラミ類 アザミウマ類		収穫前日 まで			3 回以内 (定植時の土壌混和は 1 回以内、 散布は 2 回以内)
とうがらし(葉)			収穫14日前 まで			
にがうり	コナジラミ類		収穫前日 まで			3 回以内 (定植時の土壌混和及び 育苗期への灌注は合計 1 回以内、 散布は 2 回以内)
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類					4 回以内 (定植時の土壌混和は 1 回以 内、定植後の株元散布は 1 回以内、散布は 2 回以内)
ズッキーニ	アブラムシ類					3 回以内 (育苗期の株元散布及び定植 時の土壌混和は合計 1 回 以内、散布は 2 回以内)
メロン	コナジラミ類 アザミウマ類		収穫3日前 まで			4 回以内 (育苗期の株元散布及び定植 時の土壌混和は合計 1 回以 内、定植後の株元散布は 1 回以内、散布は 2 回以内)
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ウリハムシ		収穫前日 まで			

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジメトランを含む 農薬の総使用回数
はくさい	アブラムシ類 キスジノミハムシ ダイコンハムシ	原液	収穫3日前 まで	2回 以内	希釈せず そのまま 散布する	3回以内 (定植時の土壌混和及び 灌注は合計1回以内、 散布は2回以内)
ブロッコリー	アブラムシ類					3回以内 (定植時の土壌混和及び 灌注は合計1回以内、散布及 び無人航空機散布は 合計2回以内)
キャベツ						3回以内 (育苗期の株元散布、 定植時の土壌混和及び 灌注は合計1回以内、散布 及び無人航空機散布は 合計2回以内)
非結球あぶらな科 葉菜類(チンゲンサイ、 畑わさびを除く) かぶ						キスジノミハムシ
チンゲンサイ	3回以内 (は種時及び定植時の 土壌混和は合計1回以内、 散布は2回以内)					
畑わさび	アブラムシ類			3回 以内		3回以内
だいこん	アブラムシ類 ダイコンハムシ		収穫7日前 まで	2回 以内		5回以内 (は種時の播溝土壌混和は 1回以内、は種時の全面土壌 混和は1回以内、粒剤の散布 は1回以内、水溶剤の散布、 液剤の散布及び無人航空機 散布は合計2回以内)
レタス 非結球レタス	アブラムシ類		収穫3日前 まで			4回以内 (は種前の培土混和は 1回以内、育苗期の株元 散布、定植時の土壌混和及び 育苗トレイへの灌注は合計1回 以内、散布は2回以内)
ねぎ	アザミウマ類					4回以内 (は種時の土壌混和、 育苗トレイへの灌注及び定植時 の株元散布は合計1回以内、 生育期の株元灌注は1回 以内、散布、無人航空機散布 及び定植後の株元散布は 合計2回以内)
にら	アブラムシ類 ネギアザミウマ					収穫前日 まで
アスパラガス	アザミウマ類 コナジラミ類 ジュウシホシクビナガハムシ カメシ類		3回 以内			

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノフランを 含む農薬の 総使用回数
らっきょう	アザミウマ類	原液	収穫前日 まで	3回 以内	希釈せず そのまま 散布する	3回以内
未成熟とうもろこし	アブラムシ類 カメムシ類					
セルリー	アブラムシ類		収穫14日前 まで	2回 以内		3回以内 (定植時の土壌混和は 1回以内、散布は2回以内)
にんじん			収穫7日前 まで			4回以内 (は種時の土壌混和は1回 以内、生育期の株元灌注は 1回以内、散布は2回以内)
だいず えだまめ	カメムシ類 ダイズサヤマバエ		収穫7日前 まで	2回 以内		3回以内 (は種時の土壌混和は 1回以内、散布、空中散布、 無人航空機散布は 合計2回以内)
実えんどう さやえんどう	アブラムシ類 ハモグリバエ類 ウラナミジミ カメムシ類		収穫前日 まで			3回以内 (株元散布は1回以内、 散布は2回以内)
さやいんげん	アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 カメムシ類					
okra しょうが	アブラムシ類 フタテミトノリヒメコバエ					
てんさい	アブラムシ類 テンサイモグリハバエ カメノコハムシ		収穫7日前 まで	2回 以内		3回以内 (灌注は1回以内、 散布は2回以内)
ばれいしょ	ワタアブラムシ		収穫3日前 まで	1回		2回以内
かんしょ	アブラムシ類 コナジラミ類			2回 以内		1回
すいぜんじな	アブラムシ類		収穫7日前 まで	2回 以内		2回以内
ふき	コナジラミ類		収穫7日前 まで			3回以内 (土壌表面散布は1回以内、 散布は2回以内)
りんご	アブラムシ類 キンモンボリガ シンクイムシ類 キンモンハモグリガ コナカイガラムシ類 カメムシ類		収穫前日 まで	3回 以内		3回以内
もも ネクタリン	アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類 モモチョッキリゾウムシ					

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノフランを 含む農薬の 総使用回数		
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類	原液	収穫前日 まで	3回 以内	希釈せず そのまま 散布する	3回以内		
かんきつ	アブラムシ類 ミカンハモグリガ カメムシ類 コアオハナムグリ ケンキスイ類 ミカンバエ アカマルカイガラムシ ヤノネカイガラムシ ミカンキシラミ コナシラミ類 チャノミドリヒメヨコバイ サンホーセカイガラムシ チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類							
小粒核果類	アブラムシ類 カメムシ類							
マンゴー	チャノキイロアザミウマ							
キウイフルーツ	カメムシ類							
かき	カメムシ類 コナカイガラムシ類 カキノハタムシガ アザミウマ類					4回以内 (塗布は1回以内、 散布は3回以内)		
ぶどう	カメムシ類 ブドウトラミキリ チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ類					3回以内 (塗布は1回以内)		
おうとう	オウトウショウジョウバエ カメムシ類					2回 以内		
びわ	カメムシ類 ビワキシラミ							
あけび(果実)	カメムシ類		収穫14日前 まで	5回 以内		5回以内 (土壌混和は1回以内)		
花き類・ 観葉植物 (きくを除く)	アブラムシ類 コナシラミ類							
きく	アブラムシ類 コナシラミ類 カメムシ類							
樹木類 (つつじ類、 つばき類を除く)	ケムシ類		発生初期				5回以内	5回以内
つつじ類	ケムシ類 ツツジゲンハイ							5回以内 (株元灌注は2回以内)
つばき類	ケムシ類							

46. 登録番号 23624 : ウッドスター、
登録番号 23676 : ウッドセーバー
(ジノテフラン 8.0 %液剤)

(1) ウッドスター

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
樹木類(つば き類を除く)	ケムシ類	胸高直径 6 cm~10 cm : 8~12 mL、 10 cm~20 cm : 12~24 mL、 20 cm~30 cm : 24~36 mL、 30 cm~40 cm : 36~48 mL、 40 cm~50 cm : 48~60 mL、 50 cm~60 cm : 60~72 mL、 以降、直径が10 cm増す毎に 12 mLを追加する	幼虫発生前 ～ 発生初期 但し新葉 展開後	3回 以内	樹幹 注入	5回以内
くすのき	クスベニヒラカスミカメ		幼虫発生前 ～ 発生初期			
アメリカワ	イカダ類		幼虫発生前 ～ 発生初期 但し新葉 展開後			
さくら		注入部直径 6 cm~10 cm : 8~12 mL、 10 cm~20 cm : 12~24 mL、 20 cm~30 cm : 24~36 mL、 30 cm~40 cm : 36~48 mL、 40 cm~50 cm : 48~60 mL、 50 cm~60 cm : 60~72 mL、 以降、直径が10 cm増す毎に 12 mLを追加する	新葉展開後 ～ 落葉前まで			
つばき類	チャドクガ	注入部直径 6 cm~10 cm : 2mL、 10 cm~20 cm : 2~12mL、 20 cm~30 cm : 12~18mL、 30 cm~40 cm : 18~24mL、 40 cm~50 cm : 24~30mL、 50 cm~60 cm : 30~36mL、 以降、直径が10 cm増す毎に 6 mLを追加する	幼虫発生前 ～ 発生初期		5回以内 (株元灌注 は2回以内)	
プラタナス	プラタナスグンバイ	胸高直径 6 cm~10 cm : 2mL、 10 cm~20 cm : 2~12mL、 20 cm~30 cm : 12~18mL、 30 cm~40 cm : 18~24mL、 40 cm~50 cm : 24~30mL、 50 cm~60 cm : 30~36mL、 以降、直径が10 cm増す毎に 6 mLを追加する	新葉展開後		5回以内	
ぶな	ブナハバチ		新葉展開直前			
ひのき	チャバネカミシ	注入部直径 6 cm~8 cm : 8mL、 8 cm~11 cm : 12mL、 11 cm~14 cm : 16mL、 14 cm~17 cm : 20mL、 17 cm~20 cm : 24mL、 以降、直径が3 cm増す毎に 4 mLを追加する	成虫飛来前		主枝 基部 注入	

(2) ウッドセーバー

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
デコ	デコヒメコバチ	胸高直径 6 cm~10 cm:15~30 mL 10 cm~20 cm:30~60mL 以降、直径が 10 cm 増す毎に 30~60 mL を追加する	成虫発生前又は虫えい形成期	3回以内	樹幹注入	5回以内
	ヘニモンメカ		発生前 ～ 発生初期			
ガシユマル	オキナワイチモンジハムシ					

4 7. 登録番号 23685 : ハイポネックス原液 殺虫剤入り

(ジノテフラン 2.5 %複合肥料)

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを含む農薬の 総使用回数
花き類・ 観葉植物	アブラムシ類	250 倍	2 L/m ²	発生 初期	5 回 以内	灌注	5 回以内 (土壌混和は 1 回以内)

4 8. 登録番号 23705 : サンブラススタークル箱粒剤

(ジノテフラン 2.0 %・トルプロカルブ 12.0 %粒剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ジノテフランを含む農薬の 総使用回数	トルプロカルブを含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	イネトリイモシ イネミズゾウムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ いもち病	育苗箱 (30×60×3 cm) 使用土壌約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植 3 日 前~移 植当 日	1 回	育苗箱の 苗の上か ら均一に 散布する	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計 1 回 以内、本田での 散布、空中 散布、無人航空 機散布は合計 3 回以内)	2 回以内 (移植時までの処 理は 1 回以内、 本田での湛水 散布、無人航空 機散布、投げ入 れは合計 1 回 以内)

49. 登録番号 23706 : ガッツスター粒剤、
登録番号 23707 : ゴウケツモンスター粒剤

(ジノテフラン 1.67 % ・ シメコナゾール 1.5 % ・ トルプロカルブ 3.0 % 粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	シメコナゾールを含む農薬の総使用回数	トルプロカルブを含む農薬の総使用回数
稲	カメシ類 ウカ類 ツマグロヨコバイ フタホシコヤカ いもち病 紋枯病 稲こうじ病 もみ枯細菌病 穂枯れ(ごま 葉枯病菌) 墨黒穂病 内穎褐変病	3 kg/10 a	出穂 5 日前ま で 但し、収 穫 30 日 前まで	1 回	湛水 散布	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側 条施用は 合計 1 回 以内、本田 での散布、 空中散布、 無人航空機 散布は合計 3 回以内)	2 回以内 (移植時まで の処理は 1 回以内)	2 回以内 (移植時までの 処理は 1 回 以内、本田での 湛水散布、無人 航空機散布、 投げ入れは 合計 1 回以内)

50. 登録番号 23708 : サントリプル箱粒剤、
登録番号 23840 : サンフェスタ箱粒剤

(クロラントラニプロール 0.75 % ・ ジノテフラン 6.0 % ・ トルプロカルブ 4.0 %
粒剤)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロラントラニプロールを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	トルプロカルブを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウカ類 ツマグロヨコバイ イナハシ イナズマシ コメカ コメカ イナハシ フタホシコヤカ ツマグロ類 イナハシ いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌 約 5 L) 1 箱当り 50 g 高密度には種 する場合は 1 kg/10 a (育苗箱 (30×60×3 cm、使用土壌 約 5 L) 1 箱当り 50~100 g)	移植 3 日前 ~ 移植 当日	1 回	育苗箱 の上か ら均一 に散布 する。	1 回	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側 条施用は 合計 1 回 以内、本田 での散布、 空中散布、 無人航空機 散布は合計 3 回以内)	2 回以内 (移植時までの 処理は 1 回 以内、本田での 湛水散布、無人 航空機散布、 投げ入れは 合計 1 回 以内)
稲	いもち病 イナハシ イナズマシ	1 kg/10 a	移植時		側条 施用			

5 1. 登録番号 23833 : ハイパーキック箱粒剤、
登録番号 23834 : ゴウケツバスター箱粒剤
(ジノテフラン 12.0 %・トルプロカルブ 9.0 %粒剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	トルプロカルブを 含む農薬の 総使用回数
稲 (箱育苗)	カラムシ類	育苗箱 (30×60×3 cm、使用土壌 約5 L) 1箱当り 50 g	移植 当日	1回	育苗箱の 上から 均一に 散布する。	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側条 施用は合計1回 以内、本田での 散布、空中 散布、無人航空 機散布は合計 3回以内)	2 回以内 (移植時までの 処理は 1 回 以内、本田での 湛水散布、無人 航空機散布、 投げ入れは合計 1 回以内)
		高密度には種 する場合は 1 kg/10 a (育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌 約 5 L) 1 箱当り 50~100 g)					
	ウカ類 ニカメイト ツマグロヨコバイ イネトモイシ イネズミ イネコ イネハエ フタホシコ いもち病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌 約 5 L) 1 箱当り 50 g	移植3日前 ～ 移植当日				
稲	いもち病 イネトモイシ イネズミ	1 kg/10 a	移植時		側条施用		

5 2. 登録番号 24316 : アースガーデン 4

(エトフェンプロックス 0.020 %・ジノテフラン 0.010 %・ミルベメクチン
0.00050 %・ペンチオピラド 0.010 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	エトフェンプロックス を含む農薬の総 使用回数	ジノテフラン を含む農薬の 総使用回数	ミルベメクチン を含む農薬の 総使用回数	ペンチオピラド を含む農薬の 総使用回数
ばら	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 クロゲツブチョッキリ チュウレンゾハバチ クロバネキノコバエ類 コガネムシ類 ハスモンヨトウ うどんこ病 灰色かび病 黒星病	原液	発生 初期	2 回 以内	散布	6 回 以内	5 回 以内 (土壌混和は 1 回以内)	2 回 以内	3 回 以内
ひまわり	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 クロバネキノコバエ類 ハスモンヨトウ アリダチソウゲンハバチ うどんこ病 灰色かび病								
花き類・観 葉植物(ば ら、ひまわ りを除く)	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 アザミウマ類 クロバネキノコバエ類 ハスモンヨトウ うどんこ病 灰色かび病								
樹木類 (つつじ類、 つばき類、 ひいらぎも くせい、ま さきを除く)	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 ケムシ類 イラガ類 うどんこ病						5 回 以内		
つばき類 (さざんかを 除く)							5 回以内(株 元灌注は 2 回以内)		
さざんか	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 ケムシ類 イラガ類 ツノヨムシ うどんこ病						5 回 以内		

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	エトフェンプロックス を含む農薬の総 使用回数	ジノテフラン を含む農薬の 総使用回数	ミルベメクチン を含む農薬の 総使用回数	ペンチオラト を含む農薬の 総使用回数
まさき	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 クムシ類 イラガ類 アオハハゴロモ うどんこ病	原液	発生 初期	2回 以内	散布	6回 以内	5回 以内	2回 以内	3回 以内
ひいらぎも くせい	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 クムシ類 イラガ類 ヘリガロテントウノミハム シ うどんこ病								
つつじ類	アブラムシ類 ハダニ類 コナジラミ類 クムシ類 イラガ類 ツツジグンバイ うどんこ病								

5 3. 登録番号 24344 : スタートレボン W10

(エトフェンプロックス 10.0 %・ジノテフラン 10.0 %乳剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の 総使用回数	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数
稲	カメシ類 ウカ類 ツマグロコバイ	1000倍	60~ 150L/10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内 (育苗箱への 処理及び側条施用は 合計1回以内、 本田での散布、 空中散布、無人航空機 散布は合計3回以内)
	ゴマメカ	8倍	0.8L/10a			無人航空機こ よる散布		
だいず えだまめ	カメシ類	1000倍	100~300 L/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内 (は種時の土壌混 和は1回以内、 散布、空中散布、 無人航空機散布は 合計2回以内)
		8倍	0.8 L/10 a			無人航空機に よる散布		

5 4. 登録番号 24346 : ブレードスタークルゾル

(ジノテフラン 10.0 %・フェリムゾン 15.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 稲こうじ病 内穎褐変病 もみ枯細菌病 変色米(カーブリア菌) 変色米(アルタリア菌) ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への 処理及び 側条施用は 合計 1 回 以内、本田で の散布、空中 散布、無人航 空機散布は 合計 3 回 以内)	2 回 以内	3 回 以内
		300 倍	25 L/10 a						
		8 倍	800 mL/10 a			無人航 空機に よる 散布			

5 5. 登録番号 24347 : ブレードスタークル粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類	3~4 kg/10 a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び 側条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、 空中散布、無人航空機 散布は合計 3 回以内)	2 回以内	3 回以内

5 6. 登録番号 24413 : マグアンプ K 殺虫剤入り
(ジノテフラン 0.20 %複合肥料)

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジノフランを 含む農薬の 総使用回数
なす	アブラムシ類 コジラミ類 アザミウサ類	5g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、散布及び定植後 の株元散布は合計2回以内)
	アブラムシ類 コジラミ類		生育期 但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布	
ピーマン	アブラムシ類		定植時	1回	植穴土壌混和	
			生育期 但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布	
きゅうり	アブラムシ類 コジラミ類		定植時	1回	植穴土壌混和	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、定植後の株元散 布は1回以内、散布は2回以内)
			生育期 但し、収穫開始14日前 まで	1回以内	株元散布	
トマト ミニトマト	アブラムシ類 コジラミ類		定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (培土混和及び灌漑は合計1回以内、育 苗期の株元散布は1回以内、定植時の 土壌混和は1回以内、散布及び定植後 の株元散布は合計2回以内)
			生育期 但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布	
いちご	ワタアブラムシ			定植時	1回	植穴土壌混和
花き類・ 観葉植物	アブラムシ類	100g/m ²	生育期	5回以内	株元散布	5回以内 (土壌混和は1回以内)

5 7. 登録番号 24530 : オーケストラスタークルエアー
(ジノテフラン 9.0 %・ベンズピリモキサン 10.0 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	ベンズビリメキサンを 含む農薬の 総使用回数
稲	ツマグロヨコバイ ウナカ類 カメムシ類	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への処理及び側 条施用は合計 1 回 以内、本田での散布、 空中散布、無人航空機 散布は合計 3 回以内)	3 回以内
		250 倍	25L/10a					
		16 倍	1.6L/10a			無人航空機 による散布		
		8 倍	0.8 L/10 a					

58. 登録番号 24608 : ブレードスタークル R ゾル

(ジノテフラン 9.0 %・フェリムゾン 13.5 %・フサライド 13.5 %水和剤)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ジノテフランを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 ウンカ類 カメシロ類 ツマク、ロヨコ バイ	1000 倍	60~150 L/10 a	収穫 7 日前 まで	2 回 以内	散布	4 回以内 (育苗箱への 処理及び側 条施用は 合計 1 回以 内、本田で の散布、 空中散布、 無人航空機 散布は合計 3 回以内)	2 回以内	3 回以内
		300 倍	25 L/10 a						
		8 倍	800 mL/10 a			無人航空 機による 散布			

別添 2：農薬蜜蜂影響評価部会で検討した文献一覧（ジノテフラン）

目 次

文献整理番号 1（成虫接触毒性試験）	2
文献整理番号 2（成虫接触毒性試験）	3
文献整理番号 3（成虫単回経口毒性試験）	4
文献整理番号 4（成虫単回経口毒性試験）	5
文献整理番号 5（成虫接触毒性試験及び成虫単回経口毒性試験）	6
文献整理番号 6～10：リスク評価パラメーター（LD ₅₀ 又は LDD ₅₀ ）の設定又は見直しのために利用 できないため、毒性指標の検討に用いないと分類した文献	7

文献整理番号 1 (成虫接触毒性試験)

信頼性確認シート							別紙
有効成分名	ジノテフラン	出版年	2015	文献整理番号	1	DA適合性区分* (a/b)	c
文献タイトル	Toxicity and biochemical changes in the honey bee Apis mellifera exposed to four insecticides under laboratory conditions						
著者/所属	Badawy, M.E.I.; Nasr, H.M.; Rabea, E.I./Department of Pesticide Chemistry and Technology, Faculty of Agriculture, Alexandria University, 21545 El-Shatby Alexandria, Egypt						
雑誌名等	Apidologie, 46 (2),177-193						
*当該文献の全文に適合性に基づく分類 (DA: Detailed Assessment)における適合性区分を記載。区分aの文献についてはKlimisch基準に準じた信頼性評価における分類も記載							
1. 成虫接触毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	同等条件の成虫を試験に用いている					○
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	48時間以上である					
4	温度	試験期間中23℃以上である					○
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					○
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が10%以下である					
2. 成虫単回経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	同等条件の成虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	48時間以上である					
4	温度	試験期間中23℃以上である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が10%以下である					
3. 成虫反復経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	羽化後最大2日齢の成虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	10日間以上である					
4	温度	試験期間中31℃以上である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が15%以下である					
4. 幼虫経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	孵化後1日齢幼虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	72時間以上である					
4	温度	試験期間中34～35℃である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が15%以下である					

文献整理番号 2 (成虫接触毒性試験)

信頼性確認シート							別紙
有効成分名	ジノテフラン	出版年	2019	文献整理番号	2	DA適合性区分* (a/b)	c
文献タイトル	Ecological toxicity reduction of dinotefuran to honeybee: New perspective from an enantiomeric level						
著者/所属	Chen, Z.L.; Yao, X.M.; Dong, F.S.; Duan, H.X.; Shao, X.S.; Chen, X.; Yang, T.; Wang, G.R.; Zheng, Y.Q./State Key Laboratory for Biology of Plant Diseases and Insect Pests, Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100193, PR China						
雑誌名等	Environment International, 130						
*当該文献の全文に適合性に基づく分類 (DA: Detailed Assessment)における適合性区分を記載。区分aの文献についてはKlimisch基準に準じた信頼性評価における分類も記載							
1. 成虫接触毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	同等条件の成虫を試験に用いている					○
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					○
3	試験期間	48時間以上である					○
4	温度	試験期間中23℃以上である					○
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					○
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が10%以下である					○
2. 成虫単回経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	同等条件の成虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	48時間以上である					
4	温度	試験期間中23℃以上である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が10%以下である					
3. 成虫反復経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	羽化後最大2日齢の成虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	10日間以上である					
4	温度	試験期間中31℃以上である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が15%以下である					
4. 幼虫経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	孵化後1日齢幼虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	72時間以上である					
4	温度	試験期間中34～35℃である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が15%以下である					

文献整理番号 3 (成虫単回経口毒性試験)

信頼性確認シート							別紙
有効成分名	ジノテフラン	出版年	2019	文献整理番号	3	DA適合性区分* (a/b)	c
文献タイトル	Enantioselective Olfactory Effects of the Neonicotinoid Dinotefuran on Honey Bees (<i>Apis mellifera</i> L.)						
著者/所属	Liu, S., Y. Liu, F. He, H. Zhang, X. Li, and H. Tan/Guangxi Key Laboratory for Agro-Environment and Agro-Product Safety, National Demonstration Center for Experimental Plant Science Education, College of Agriculture, Guangxi University, Nanning, Guangxi 530004, People's Republic of China						
雑誌名等	J. Agric. Food Chem. 67(43): 12105-12116						
* 当該文献の全文に適合性に基づく分類 (DA: Detailed Assessment) における適合性区分を記載。区分aの文献についてはKlimisch基準に準じた信頼性評価における分類も記載							
1. 成虫接触毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	同等条件の成虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	48時間以上である					
4	温度	試験期間中23℃以上である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が10%以下である					
2. 成虫単回経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	同等条件の成虫を試験に用いている					○
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					○
3	試験期間	48時間以上である					○
4	温度	試験期間中23℃以上である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					○
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が10%以下である					
3. 成虫反復経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	羽化後最大2日齢の成虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	10日間以上である					
4	温度	試験期間中31℃以上である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が15%以下である					
4. 幼虫経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	孵化後1日齢幼虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	72時間以上である					
4	温度	試験期間中34～35℃である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が15%以下である					

文献整理番号 4 (成虫単回経口毒性試験)

信頼性確認シート							別紙
有効成分名	ジノテフラン	出版年	2021	文献整理番号	4	DA適合性区分* (a/b)	c
文献タイトル	The transcriptomic landscape of molecular effects after sublethal exposure to dinotefuran on Apis mellifera						
著者/所属	Zhang, Y.H.; Du, Y.L.; Ma, W.H.; Liu, J.J.; Jiang, Y.S./College of Animal Sciences, Shanxi Agricultural University, Taigu 030801, China						
雑誌名等	Insects, 12 (10)						
*当該文献の全文に適合性に基づく分類 (DA: Detailed Assessment) における適合性区分を記載。区分aの文献についてはKlimisch基準に準じた信頼性評価における分類も記載							
1. 成虫接触毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	同等条件の成虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	48時間以上である					
4	温度	試験期間中23℃以上である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が10%以下である					
2. 成虫単回経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	同等条件の成虫を試験に用いている					○
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					○
3	試験期間	48時間以上である					○
4	温度	試験期間中23℃以上である					○
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					○
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が10%以下である					
3. 成虫反復経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	羽化後最大2日齢の成虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	10日間以上である					
4	温度	試験期間中31℃以上である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が15%以下である					
4. 幼虫経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	孵化後1日齢幼虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	72時間以上である					
4	温度	試験期間中34～35℃である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が15%以下である					

文献整理番号 5 (成虫接触毒性試験及び成虫単回経口毒性試験)

信頼性確認シート							別紙
有効成分名	ジノテフラン	出版年	2022	文献整理番号	5	DA適合性区分* (a/b)	c
文献タイトル	Toxicological effect and molecular mechanism of the chiral neonicotinoid dinotefuran in honeybees						
著者/所属	Zhang, Q.; Fu, L.L.; Cang, T.; Tang, T.; Guo, M.C.; B.B.; Zhu, Zhu, G.H.; G.H.; Zhao, M.R. /Key Laboratory of Microbial Technology for Industrial Pollution Control of Zhejiang Province, College of Environment, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, Zhejiang 310032, China						
雑誌名等	Environmental Science & Technology, 56 (2), 1104-1112						
*当該文献の全文に適合性に基づく分類 (DA: Detailed Assessment) における適合性区分を記載。区分aの文献についてはKlimisch基準に準じた信頼性評価における分類も記載							
1. 成虫接触毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	同等条件の成虫を試験に用いている					○
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					○
3	試験期間	48時間以上である					○
4	温度	試験期間中23℃以上である					○
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					○
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が10%以下である					
2. 成虫単回経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	同等条件の成虫を試験に用いている					○
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					○
3	試験期間	48時間以上である					○
4	温度	試験期間中23℃以上である					○
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					○
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が10%以下である					
3. 成虫反復経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	羽化後最大2日齢の成虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	10日間以上である					
4	温度	試験期間中31℃以上である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が15%以下である					
4. 幼虫経口毒性試験							
No.	チェック項目						はい
1	試験生物	孵化後1日齢幼虫を試験に用いている					
2	被験物質	「原体」又は「有効成分」である					
3	試験期間	72時間以上である					
4	温度	試験期間中34～35℃である					
5	対照区	被験物質を含まない試験区が設定されている					
6		被験物質を含まない試験区の死亡率が15%以下である					

文献整理番号6～10：リスク評価パラメーター（LD₅₀ 又は LDD₅₀）の設定又は見直しのために利用できないため、毒性指標の検討に用いないと分類した文献

（これらの文献について、その多くは、帰巢飛行、嗅覚学習、運動機能や姿勢制御等の行動異常をエンドポイントとした毒性試験に関する研究成果であった。）

文献整理番号	著者	出版年	論文表題	掲載誌名、号、ページ等	分類の判断理由
6	Matsumoto, T.	2013	Reduction in homing flights in the honey bee <i>Apis mellifera</i> after a sublethal dose of neonicotinoid insecticides	Bulletin of Infectiology, 66 (1), 1-9	・致死をエンドポイントとした試験ではない ・帰巢飛行をエンドポイントとした試験の文献
7	Williamson, S.M.; Willis, S.J.; Wright, G.A.	2014	Exposure to neonicotinoids influences the motor function of adult worker honeybees	Ecotoxicology, 23 (8), 1409-1418	・致死をエンドポイントとした試験ではない ・運動機能・姿勢制御をエンドポイントとした試験の文献
8	Yue, M.; Luo, S.D.; Liu, J.L.; Wu, J.	2018	<i>Apis cerana</i> is less sensitive to most neonicotinoids, despite of their smaller body mass	Journal of Economic Entomology, 111(1), 39-42	・LD ₅₀ の再解析ができない ・成虫経口毒性試験が実施され、LC ₅₀ の報告はあるが、摂餌量不明でLD ₅₀ を求めることはできない
9	Mustard, JA; Gott, A; Scott, J; Chavarria, NL; Wright, GA	2020	Honeybees fail to discriminate floral scents in a complex learning task after consuming a neonicotinoid pesticide	JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, 223(5), jeb217174	・致死をエンドポイントとした試験ではない ・嗅覚学習をエンドポイントとした試験の文献
10	Huang, MJ; Dong, J; Guo, HK; Xiao, MH; Wang, DQ	2021	Identification of long noncoding RNAs reveals the effects of dinotefuran on the brain in <i>Apis mellifera</i> (Hymenoptera: Apidae)	BMC GENOMICS, 22(1), 502	・致死をエンドポイントとした試験ではない ・脳における長鎖ノンコーディングRNA (lncRNA) 発現に与える影響をエンドポイントとした試験の文献

別添 3：暴露量の推計（ジノテフラン）

目 次

1. 登録番号 20805：スタークル粒剤、 登録番号 20806：アルバリン粒剤、 登録番号 20807：ホクコースタークル粒剤、 登録番号 20959：三井東圧アルバリン粒剤、 登録番号 22738：スターガード粒剤 （ジノテフラン 1.0 %粒剤）	5
2. 登録番号 20808：スタークル箱粒剤、 登録番号 20960：三井東圧アルバリン箱粒剤 （ジノテフラン 2.0 %粒剤）	23
3. 登録番号 20811：スタークル顆粒水溶剤、 登録番号 20812：アルバリン顆粒水溶剤、 登録番号 20813：ホクコースタークル顆粒水溶剤、 登録番号 20961：三井東圧アルバリン顆粒水溶剤、 登録番号 22130：わさび用緑風 SG （ジノテフラン 20.0 %水溶剤）	24
4. 登録番号 20814：スタークル粉剤 DL、 登録番号 20815：アルバリン粉剤 DL、 登録番号 20816：ホクコースタークル粉剤 DL、 登録番号 20962：三井東圧アルバリン粉剤 DL （ジノテフラン 0.50 %粉剤）	38
5. 登録番号 20836：スタークルトレボン粉剤 DL （エトフェンプロックス 0.30 %・ジノテフラン 0.50 %粉剤）	39
6. 登録番号 21025：ホクコーラブサイドスタークル粉剤 DL （ジノテフラン 0.35 %・フサライド 2.5 %粉剤）	39
7. 登録番号 21027：ビームスタークル粉剤 5 DL （ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤）	40
8. 登録番号 21191：ビームバシスタークル粉剤 5 DL （ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・メプロニル 3.0 %粉剤）	40
9. 登録番号 21228：側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤 （ジノテフラン 4.0 %・プロベナゾール 48.0 %水和剤）	41
10. 登録番号 21248：スタークル L 粉剤 DL、 登録番号 21435：スタークルメイト L 粉剤 DL （ジノテフラン 0.35 %粉剤）	41
11. 登録番号 21259：スタークル液剤 10、 登録番号 21260：スタークルメイト液剤 10、 登録番号 24582：アルバリン液剤 10 （ジノテフラン 10.0 %液剤）	42
12. 登録番号 21276：スタークル 1 キロ H 粒剤、 登録番号 21277：スタークルメイト 1 キロ H 粒剤	

(ジノテフラン 3.0 %粒剤)	46
1 3. 登録番号 21496 : ビルダースタークル箱粒剤、 登録番号 21497 : ホクコービルダースタークル箱粒剤 (ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %粒剤)	47
1 4. 登録番号 21607 : スタークルエアー50、 登録番号 21608 : スタークルメイトエアー50、 登録番号 24012 : ファームスター顆粒水溶剤 50 (ジノテフラン 50.0 %水溶剤)	47
1 5. 登録番号 21710 : ホクコーラブサイドスタークルフロアブル (ジノテフラン 5.0%・フサライド 12.0 %水和剤)	48
1 6. 登録番号 21801 : ワイドナーエース粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・ブプロフェジン 1.0 %・フサライド 2.5 %・ フルトラニル 2.0 %粉剤)	48
1 7. 登録番号 21871 : コラトップスタークル1 キロ粒剤 (ジノテフラン 5.0 %・ピロキロン 15.0 %粒剤)	49
1 8. 登録番号 21886 : イモチエーススタークル粒剤、 登録番号 21888 : ホクコーイモチエーススタークル粒剤 (ジノテフラン 1.67 %・メトミノストロビン 4.0 %粒剤)	49
1 9. 登録番号 21975 : トレボンスター粉剤 DL (エトフェンプロックス 0.40 %・ジノテフラン 0.20 %粉剤)	50
2 0. 登録番号 22036 : ビームエイトスタークルゾル (ジノテフラン 10.0 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)	50
2 1. 登録番号 22037 : トレボンスターフロアブル (エトフェンプロックス 7.0 %・ジノテフラン 3.0 %水和剤)	51
2 2. 登録番号 22063 : 日農ビームアブロードスタークル粉剤 5 DL、 登録番号 22064 : クミアイビームアブロードスタークル粉剤 5 DL (ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.0 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)	51
2 3. 登録番号 22102 : ビームモンセレンスタークル粉剤 5 DL (ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉剤)	52
2 4. 登録番号 22180 : サジェスト微粒剤 F (ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉粒剤)	52
2 5. 登録番号 22268 : ビームモンカットスタークル F 粉剤 5 DL (ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)	53
2 6. 登録番号 22332 : スタークル豆つぶ、 登録番号 22333 : クミアイスタークル豆つぶ、 登録番号 22495 : スタークルメイト豆つぶ (ジノテフラン 12.0 %剤)	53
2 7. 登録番号 22416 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤、 登録番号 22417 : 明治 Dr. オリゼスタークル箱粒剤、 登録番号 23950 : オリザエートスター箱粒剤 (ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 25.0 %粒剤)	54
2 8. 登録番号 22426 : ビームスタークル微粒剤 F (ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉粒剤)	54

29. 登録番号 22479 : ダブルカットスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.11 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)	55
30. 登録番号 22642 : ホクコートトップジンスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・チオファネートメチル 2.0 %粉剤)	55
31. 登録番号 22660 : MIC ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤 (クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %粒剤)	56
32. 登録番号 22661 : クミアイアブロードスタークルゾル、 登録番号 22662 : アブロードスタークルゾル (ジノテフラン 9.0 %・ブプロフェジン 18.0 %水和剤)	56
33. 登録番号 22725 : キックオフ顆粒水和剤 (クロラントラニリプロール 4.0 %・ジノテフラン 15.0 %水和剤)	57
34. 登録番号 22784 : アブロードモンカットスタークル F 粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.5 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)	58
35. 登録番号 22924 : ホクコートトップジンスタークルフロアブル (ジノテフラン 5.0 %・チオファネートメチル 20.0 %水和剤)	58
36. 登録番号 22981 : ダブルカットバリダスタークル粉剤 3 DL (ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %粉剤)	59
37. 登録番号 22995 : ダブルカットスタークルフロアブル (ジノテフラン 10.0 %・カスガマイシン 1.37 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)	59
38. 登録番号 23074 : アトラクトン箱粒剤、 登録番号 24075 : スターダム箱粒剤 (ジノテフラン 12.0 %粒剤)	60
39. 登録番号 23076 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、 登録番号 23077 : 明治 Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、 登録番号 23078 : ロングリーチ箱粒剤 (ジノテフラン 12.0 %・プロベナゾール 24.0 %粒剤)	61
40. 登録番号 23113 : イッカツエース粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %粉剤)	62
41. 登録番号 23365 : フェルテラスタークル箱粒剤 CU (クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %粒剤)	62
42. 登録番号 23370 : スケルカット顆粒水和剤、 登録番号 23371 : スケルノック顆粒水和剤 (ジノテフラン 40.0 %水和剤)	63
43. 登録番号 23372 : スターガードプラス AL (ジノテフラン 0.010 %・ペンチオピラド 0.010 %水和剤)	64
44. 登録番号 23405 : トライスタークル粉剤 DL、 登録番号 23407 : クミアイトライスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・テブフロキン 1.0 %粉剤)	66
45. 登録番号 23506 : オールスタースプレー (ジノテフラン 0.010 %液剤)	67
46. 登録番号 23624 : ウッドスター、	

登録番号 23676 : ウッドセーバー (ジノテフラン 8.0 %液剤)	70
4 7. 登録番号 23685 : ハイポネックス原液 殺虫剤入り (ジノテフラン 2.5 %複合肥料)	71
4 8. 登録番号 23705 : サンブラススタークル箱粒剤 (ジノテフラン 2.0 %・トルプロカルブ 12.0 %粒剤)	71
4 9. 登録番号 23706 : ガッツスター粒剤、 登録番号 23707 : ゴウケツモンスター粒剤 (ジノテフラン 1.67 %・シメコナゾール 1.5 %・トルプロカルブ 3.0 %粒剤)	72
5 0. 登録番号 23708 : サントリプル箱粒剤、 登録番号 23840 : サンフェスタ箱粒剤 (クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %・トルプロカルブ 4.0 %粒剤)	72
5 1. 登録番号 23833 : ハイパーキック箱粒剤、 登録番号 23834 : ゴウケツバスター箱粒剤 (ジノテフラン 12.0 %・トルプロカルブ 9.0 %粒剤)	73
5 2. 登録番号 24316 : アースガーデン 4 (エトフェンプロックス 0.020 %・ジノテフラン 0.010 %・ミルベメクチン 0.00050 %・ペンチ オピラド 0.010 %水和剤)	74
5 3. 登録番号 24344 : スタートレボン W10 (エトフェンプロックス 10.0 %・ジノテフラン 10.0 %乳剤)	75
5 4. 登録番号 24346 : ブレードスタークルゾル (ジノテフラン 10.0 %・フェリムゾン 15.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)	75
5 5. 登録番号 24347 : ブレードスタークル粉剤 DL (ジノテフラン 0.35 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)	76
5 6. 登録番号 24413 : マグァンプ K 殺虫剤入り (ジノテフラン 0.20 %複合肥料)	77
5 7. 登録番号 24530 : オーケストラスタークルエアー (ジノテフラン 9.0 %・ベンズピリモキサン 10.0 %水和剤)	78
5 8. 登録番号 24608 : ブレードスタークル R ゾル (ジノテフラン 9.0 %・フェリムゾン 13.5 %・フサライド 13.5 %水和剤)	78

1. 登録番号 20805 : スタークル粒剤、
登録番号 20806 : アルバリン粒剤、
登録番号 20807 : ホクコースタークル粒剤、
登録番号 20959 : 三井東圧アルバリン粒剤、
登録番号 22738 : スターガード粒剤
(ジノテフラン 1.0 %粒剤)

(1) スタークル粒剤、アルバリン粒剤、ホクコースタークル粒剤及び三井東圧アルバリン粒剤

(1) -1 スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
									最大値		平均値		接 触	経口			接 触	経口			
														成虫		幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
									花粉	花蜜	花粉	花蜜		単回	反復						
稲	ウンカ類等	3 kg/10 a	収穫7日前ま で	3000	散布	土壌 処理	P	0.30	0.086				-	0.00083		0.00031	-	0.064	0.083	0.000094	不要
きゅうり	ハモグリバエ類	2 g/株* (1100 株 /10 a)	育苗期	1100	株元 散布	土壌 処理	PN	0.11	0.063				-	0.0095		0.0078	-	0.73	0.95	0.0024	要
	ハモグリバエ類 等		定植時		植穴土 壤混和				0.10	0.029	0.058	0.014		0.0050	0.0026	0.0038		0.39	0.26	0.0012	
	コナジラミ類		1 g/株 (1100 株 /10 a)	育苗期	1100		株元 散布	PN	0.11	0.032				-	0.0047		0.0039	-	0.36	0.47	0.0012
	アブラムシ類	生育期		0.10						0.029	0.058	0.014	0.0050		0.0026	0.0038	0.39		0.26	0.0012	
	コナジラミ類等	生育期 但し、収穫開 始 14 日前 まで		1100	株元 散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)														要
	コナジラミ類等	2 g/株* (1100 株 /10 a)	定植時	1100	植穴土 壤混和		PN	0.11	0.063				-	0.0095		0.0078	-	0.73	0.95	0.0024	要
					0.10	0.029			0.058	0.014	0.0050	0.0026		0.0038	0.39	0.26		0.0012			

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bce)				推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法				
									最大値		平均値		接 触	経口			接 触	経口						
									成虫		幼虫	成虫												
									花粉	花蜜		花粉		花蜜	単回	反復		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫			
うり類 (漬物用)	アザミウマ類	2 g/株 (555 株 /10 a)	定植時	1110	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.032				-	0.0048		0.0039	-	0.37	0.48	0.0012	不要			
	アブラムシ類等								0.10	0.029	0.058	0.015	0.0051	0.0026	0.0039		0.39	0.26	0.0012					
メロン	アブラムシ類	1 g/株 (590 株 /10 a)	育苗期	590	株元 散布	土壌 処理	PN	0.059	0.017				-	0.0025		0.0021	-	0.19	0.25	0.00063	不要			
			定植時		植穴 土壌 混和																			
	コナジラミ類	2g/株* (590 株 /10 a)	育苗期	1100	株元 散布			0.11	0.034				-	0.0051		0.0042	-	0.39	0.51	0.0013	要			
			定植時		植穴 土壌 混和				0.10	0.029	0.058	0.014		0.0050	0.0026	0.0038		0.39	0.26	0.0012				
	ハモクギリハエ 類		育苗期		株元 散布																			
	アザミウマ類		定植時		植穴 土壌 混和																			
	すいか	ワタアブラムシ	2 g/株 (460 株 /10 a)	定植時	920			植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.092	0.026				-	0.0040		0.0033	-	0.30	0.40	0.0010	不要
				生育期 但し、収 穫 21 日 前まで				株元 散布		PN	0.092	0.026				-	0.0040		0.0033	-	0.30	0.40	0.0010	不要
育苗期				PN		0.092	0.026				-	0.0040		0.0033	-	0.30	0.40	0.0010	不要					
かぼちゃ	アブラムシ類 等	2 g/株 (380 株 /10 a)	定植時	760	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.076	0.021				-	0.0033		0.0027	-	0.25	0.33	0.00082	不要			

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
									最大値		平均値		接 触	経口			接 触	経口			
									成虫		幼虫	成虫		幼虫							
									花粉	花蜜		花粉			花蜜	単回		反復	成虫/ 単回		成虫/ 反復
にがうり	コナジラミ類	2 g/株 (150 株 /10 a)	定植時	300	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.030	0.0086				-	0.0013		0.0011	-	0.10	0.13	0.00032	不要
ズッキーニ	コナジラミ類	2 g/株* (1110 株 /10 a)	定植時	1100	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.064				-	0.0095		0.0079	-	0.73	0.95	0.0024	要
	0.10								0.029	0.058	0.014	0.0050		0.0026	0.0038	0.39		0.26	0.0012		
	アブラムシ類	1 g/株 (1110 株 /10 a)	生育期 但し、収 穫開始 14 日前 まで	-	株元 散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)														要
なす	ハモクシリハエ 類	2 g/株 (1000 株 /10 a)	育苗期	2000	株元 散布	土壌 処理	P	0.20	0.057				-	0.00055		0.00021	-	0.042	0.055	0.000063	不要
	ハモクシリハエ 類等	2 g/株 (1000 株 /10 a)	定植時		植穴 土壌 混和				0.00028		0.00010	0.021		0.028	0.000031						
	コナジラミ類		育苗期		株元 散布																
	アブラムシ類	1 g/株 (1000 株 /10 a)	定植時	植穴 土壌 混和	0.00028			0.00010	0.021	0.028	0.000031										
	コナジラミ類 等		生育期 但し、収 穫前日ま で	株元 散布																	

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bce)				推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
									最大値		平均値		接 触	経口			接 触	経口			
														成虫		幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
									花粉	花蜜	花粉	花蜜		単回	反復						
ピーマン	アブラムシ類	2 g/株* (1700 株 /10 a)	定植時	1100	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.10				-	0.015		0.012	-	1.1	1.5	0.0037	要
	0.10	0.029		0.058					0.014	0.0050	0.0026	0.0038		0.39	0.26	0.0012					
	アブラムシ類	1 g/株* (1700 株 /10 a)	生育期 但し、収 穫前日ま で	1100	0.049				0.0073		0.0060	-		0.56	0.73	0.0018	要				
		0.10			0.029			0.058	0.014	0.0050	0.0026			0.0038	0.39	0.26		0.0012			
	コナジラミ類	1 g/株 (1700 株 /10 a)	育苗期	1100	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)														要		
		1 g/株* (1700 株 /10 a)			PN		0.11	0.049				-	0.0073		0.0060	-	0.56	0.73	0.0018	要	
	0.10	0.029	0.058	0.014				0.0050	0.0026	0.0038	0.39		0.26	0.0012							
トマト	コナジラミ類	培土 1 L 当り 10 g	は種前	1056	培土 混和	土壌 処理	P	0.11	0.030				-	0.00029		0.00011	-	0.022	0.029	0.000033	不要
	ハモク・リハ・エ 類等	2 g/株 (1900 株 /10 a)	定植時	3800	植穴 土壌 混和			0.38	0.11					0.0010		0.00039		0.081	0.10	0.00012	
		育苗期	株元 散布						0.11					0.0010		0.00039		0.081	0.10	0.00012	
	コナジラミ類	1 g/株 (1900 株 /10 a)	生育期 但し、収 穫前日ま で	1900	株元 散布			0.19	0.055					0.00052		0.00020		0.040	0.052	0.000060	
	アブラムシ類		定植時						植穴 土壌 混和					0.055				0.00052		0.00020	

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bce)				推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
									最大値		平均値		接 触	経口			接 触	経口			
									成虫		幼虫	成虫		幼虫							
									花粉	花蜜		花粉			花蜜	単回		反復	成虫/ 単回		成虫/ 反復
ミント	コナジラミ類	培土 1 L 当り 10 g	は種前	1167	培土 混和	土壌 処理	P	0.12	0.034				-	0.00032		0.00012	-	0.025	0.032	0.000037	不要
	ハモグリハエ 類等	2 g/株 (2100 株 /10 a)	定植時	4200	植穴 土壌 混和			0.42	0.12					0.0012		0.00043		0.089	0.12	0.00013	
		コナジラミ類	1 g/株 (2100 株 /10 a)		生育期 但し、収穫 前日まで			2100	株元 散布	0.21	0.060				0.00058			0.00022	0.045	0.058	
	アブラムシ類	定植時		植穴 土壌 混和																	
とうが らし類	アザミウマ類	2 g/株* (2080 株 /10 a)	定植時	1100	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.12				-	0.018		0.015	-	1.4	1.8	0.0045	要
				0.10					0.029	0.058	0.014	0.0050		0.0026	0.0038	0.39		0.26	0.0012		
	アブラムシ類	1 g/株* (2080 株 /10 a)	生育期 但し、収 穫開始 14 日前 まで	1100	株元 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.060				-	0.0089		0.0074	-	0.69	0.89	0.0022	要
									0.10	0.029	0.058	0.014		0.0050	0.0026	0.0038		0.39	0.26	0.0012	
			1 g/株 (2080 株 /10 a)	-	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)													要		
	コナジラミ類	1 g/株* (2080 株 /10 a)	育苗期	1100	株元 散布	土壌 処理	PN	0.11	0.060				-	0.0089		0.0074	-	0.69	0.89	0.0022	要
			0.10	0.029					0.058	0.014	0.0050	0.0026		0.0038	0.39	0.26		0.0012			

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
									最大値		平均値		接 触	経口		接 触	経口				
														成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
									花粉	花蜜	花粉	花蜜		単回	反復						
とうが らし (葉)	アザミウマ類 等	1 g/株* (2080 株 /10 a)	定植時 但し、収 穫 30 日 前まで	1100	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.060				-	0.0089		0.0074	-	0.69	0.89	0.0022	要
									0.10	0.029	0.058	0.014		0.0050	0.0026	0.0038		0.39	0.26	0.0012	

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜 濃度(μg/g)		推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
								最大値	平均値	接 触	経口		接 触	経口				
											成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
											単回	反復						
キャベツ	アブラムシ類	2 g/株	育苗期	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
	アオムシ等	3 g/株																
	ハイマダラノメイ ガ	3 g/株																
はくさい	アブラムシ類	2 g/株	定植時	植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
	アオムシ等	3 g/株																
	ハイマダラノメイ ガ	3 g/株																
ブロッコリー	アブラムシ類等	2 g/株			ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
ねぎ	アザミウマ類等	6 kg/10 a	は種時	播溝 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
	定植時		株元 散布															
	生育期 但し、収 穫3日前 まで																	
	アザミウマ類等																	
	ハモグリバエ類	9 kg/10 a																
わけぎ	アザミウマ類等	6 kg/10 a	生育期 但し、収 穫21日 前まで	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
らっきょう	アザミウマ類等		生育期 但し、収 穫前日ま で	散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜 濃度(μg/g)		推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
								最大値	平均値	接 触	経口		接 触	経口				
											成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
											単回	反復						
にんじん	ハモグリハエ類	9 kg/10 a	は種時	播溝 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
セルリー	アブラムシ類	2 g/株	定植時	植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
だいこん	アブラムシ類	6 kg/10 a	は種時	播溝 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
	キスジノミハムシ	6 kg/10 a		全面 土壌 混和														
		12 kg/10 a																
	タネハエ	6 kg/10 a	生育期但 し、収穫 30 日前ま で	散布														
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6 kg/10 a	定植時	土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
非結球あぶ らな科葉菜 類(チンゲンサイを 除く)	アブラムシ類等		は種時	播溝 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
かぶ					ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	
ほうれんそ う	アブラムシ類				ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)												不要	

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜 濃度(μg/g)		推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
								最大値	平均値	接 触	経口		接 触	経口				
											成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
											単回	反復						
レタス 非結球レタス	ハモグリバエ	培土 1 L 当り 15 g	は種前	培土 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)											不要		
		1 g/株	育苗期後 半	株元 散布														
	アブラムシ類等	2 g/株	定植時	植穴 土壌 混和														
しゅんぎく	ハモグリバエ類	9 kg/10 a	は種時	播溝 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)											不要		
			定植時	植溝 土壌 混和														
いちご	ワタアブラムシ	1 g/株		植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)											要		
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	20 g/株	育苗期	株元 散布	閉鎖系施設栽培以外では、開花している場合は摘花してから使用し、使用 後は開花期終了まで摘花する											要		
なし(苗木)	アブラムシ類	20 g/株(但 し、10 a 当り 110 kg まで)	育苗期	株元 散布	閉鎖系施設栽培以外では、開花している場合は摘花してから使用し、使用 後は開花期終了まで摘花する											要		
くわい	アブラムシ類	3 kg/10 a	収穫 30 日前 まで	散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)											不要		
ふき		20 kg/10 a	定植後～ 生育期(草 丈 20 cm 頃まで)但 し、収穫 45 日前ま で	土壌 表面 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)											不要		

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜 濃度(μg/g)		推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
								最大値	平均値	接 触	経口		接 触	経口				
											成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
											単回	反復						
しょうが	クロハネキノコハエ類	9 kg/10 a	生育期 但し、収 穫 14 日 前まで	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)											不要		
オクラ さやいんげん	アブラムシ類		生育期 但し、収 穫開始 14 日前まで		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要		
さやえんどう 実えんどう	ハモグリバエ類		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要				
だいず えだまめ	フタスジヒメハムシ	6 kg/10 a	は種時	播溝 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要		
さとうきび	カンシャコハネ ガカラムシ	9 kg/10 a	生育期 但し、 収穫 45 日前 まで	散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)											不要		
	メイチュウ類	9kg/10a																
葉ごぼう	アブラムシ類	6 kg/10 a	は種時	全面 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)											不要		
			生育期 但し、収 穫 21 日 前まで	株元 散布														
しそ	マテイラコナカイ ガラムシ	2 g/株 (但し、10 a 当り 25 kg まで)	定植時	植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培以外で使用する場合、開花させない)											要		

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜 濃度(μg/g)		推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標				被害 防止 方法	
								最大値	平均値	接 触	経口		接 触	経口					
											成虫			幼虫	成虫/		成虫/ 反復		幼虫
											単回	反復			単回				
食用ぎく	アブラムシ類	1 g/株 (但し、10 a 当り 30 kg まで)	定植時	植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)											要			
		20 kg/10 a	生育期 但し、収 穫前日ま で	株元 散布															
	マメハモクグリハエ	2 g/株 (但し、10 a 当り 30 kg まで)	定植時	植穴 土壌 混和															
茶	クワシロカイガラムシ	12 kg/10 a	摘採 7 日 前 まで	株元 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)											不要			
きく ガーベラ	マメハモクグリハエ	2 g/株 (但し、10 a 当り 30 kg まで)	定植時	植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)											要			
	コナジラミ類等	1 g/株 (但し、10 a 当り 30 kg まで)																	
	アブラムシ類	20 kg/10 a	生育期	株元 散布															

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜 濃度(μg/g)		推計暴露量 (μg/bee)			推計暴露量/毒性指標				被害 防止 方法	
								最大値	平均値	接 触	経口		接 触	経口				
											成虫			幼虫	成虫/			
											単回	反復			単回	反復		幼虫
花き類・観葉植 物(きく、ガーベ ラを除く)	コナジラミ類等	1 g/株 (但し、10 a 当り 30 kg まで)	定植時	植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (開花前に収穫する作物以外は、閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要			
	アブラムシ類	20 kg/10 a	生育期															
つつじ類	ツツジゲンハイ	6 kg/10 a	発生初期	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (「閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」または「発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」)										要			
いぐさ	イグサシロミカ	4kg/10 a		散布	土壌 処理	P	0.40	0.11	-	0.0011	0.00041	-	0.085	0.11	0.00013	不要		

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

*被害防止方法として「1.1 kg/10 a を超える場合は、閉鎖施設栽培での使用に限る」を課した上で、実測値を用いた推計暴露量の精緻化を実施

(2) スターガード粒剤

(2) -1 スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	最大 使用 量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
									最大値		平均値		接 触	経口		接 触	経口					
														成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫	
									花粉	花蜜	花粉	花蜜		単回	反復							
きゅうり	ハモク [®] リハ [®] エ 類等	2 g/株* (1100 株 /10 a)	定植時	1100	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.063				-	0.0095		0.0078	-	0.73	0.95	0.0024	要	
					0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39		0.26	0.0012							
		ア [®] ラムシ類 等	1 g/株 (1100 株 /10 a)	生育期 但し、収 穫開始 14 日前まで	-	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)													要		
メロン	ハモク [®] リハ [®] エ 類等	2 g/株* (590 株 /10 a)	定植時	1100	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.034				-	0.0051		0.0042	-	0.39	0.51	0.0013	要	
		0.10		0.029				0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038		0.39	0.26	0.0012						
		ア [®] ラムシ類		1 g/株 (590 株 /10 a)				590	0.059	0.017				-	0.0025		0.0021	-	0.19	0.25	0.00063	不要
		コナシ [®] ラムシ類		2 g/株* (590 株 /10 a)				1100	0.11	0.034				-	0.0095		0.0078	-	0.73	0.95	0.0024	要
				0.10	0.029	0.058	0.014	0.0050	0.0026	0.0038	0.39	0.26	0.0012									
すいか	ワタア [®] ラムシ	2 g/株 (460 株 /10 a)	定植時	920	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.092	0.026				-	0.0040		0.0033	-	0.30	0.40	0.0010	不要	
			生育期 但し、収 穫 21 日 前まで		株元 散布	土壌 処理	PN	0.092	0.026				-	0.0040		0.0033	-	0.30	0.40	0.0010	不要	

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	最大 使用 量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bec)				推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法
									最大値		平均値		接 触	経口		接 触	経口			
														成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	
									花粉	花蜜	花粉	花蜜		単回	反復					
かぼちゃ	アブラムシ類 等	2 g/株 (380 株 /10 a)	定植時	760	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.076	0.021				-	0.0033	0.0027	-	0.25	0.33	0.00082	不要
なす	ハモクアリハエ 類等	2 g/株 (1000 株 /10 a)	定植時	2000	株元 散布 植穴 土壌 混和	土壌 処理	P	0.20	0.057				-	0.00055	0.00021	-	0.042	0.055	0.000063	不要
	コナジラミ類	1 g/株 (1000 株 /10 a)	生育期但 し、収穫 前日まで	1000				0.10	0.029				-	0.00028	0.00010	-	0.021	0.028	0.000031	
	アブラムシ類		定植時																	
トマト	ハモクアリハエ 類	2 g/株 (1900 株 /10 a)	定植時	3800	株元 散布 植穴 土壌 混和	土壌 処理	P	0.38	0.11				-	0.0010	0.00039	-	0.081	0.10	0.00012	不要
	コナジラミ類	1 g/株 (1900 株 /10 a)	生育期但 し、収穫 前日まで	1900				0.19	0.055				-	0.00052	0.00020	-	0.040	0.052	0.000060	
	アブラムシ類		定植時																	
ミニトマト	ハモクアリハエ 類	2 g/株 (2100 株 /10 a)	定植時	4200	株元 散布 植穴 土壌 混和	土壌 処理	P	0.42	0.12				-	0.0012	0.00043	-	0.089	0.12	0.00013	不要
	コナジラミ類	1 g/株 (2100 株 /10 a)	生育期但 し、収穫 前日まで	2100				0.21	0.060				-	0.00058	0.00022	-	0.045	0.058	0.000066	
	アブラムシ類		定植時																	

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	最大 使用 量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
									最大値		平均値		接 触	経口		接 触	経口				
														成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
									花粉	花蜜	花粉	花蜜		単回	反復						
ピーマン	アブラムシ類	2 g/株* (1700 株 /10 a)	定植時	1100	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.11	0.10				-	0.015		0.012	-	1.1 0.39	1.5 0.26	0.0037 0.0012	要
									0.10	0.029	0.058	0.014		0.0050	0.0026						
	アブラムシ類	1 g/株* (1700 株 /10 a)	1100	0.11	0.049				-	0.0073		0.0060	-	0.56 0.39	0.73 0.26	0.0018 0.0012	要				
					0.10	0.029	0.058	0.014		0.0050	0.0026							0.0038			
		1 g/株 (1700 株 /10 a)	生育期 但し、収 穫前日ま で	-	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)															要
	とうがらし 類	アザミウマ類	2 g/株* (2080 株 /10 a)	定植時	1100	植穴 土壌 混和	土壌 処理	PN	0.42	0.12				-	0.018		0.015	-	1.4 0.39	1.8 0.26	0.0045 0.0012
0.10										0.029	0.058	0.014	0.0050		0.0026	0.0038					
アブラムシ類		1 g/株* (2080 株 /10 a)	1100	0.21	0.060				-	0.0089		0.0074	-	0.69 0.39	0.89 0.26	0.0022 0.0012	要				
					0.10	0.029	0.058	0.014		0.0050	0.0026							0.0038			
		1 g/株 (2080 株 /10 a)	生育期 但し、収 穫開始 14 日前まで	-	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)															要
キャベツ		アブラムシ類	2 g/株	定植時	-	植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														
	アオムシ等	3 g/株																			
	ハイマダラノメイ ガ	3 g/株																			

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	最大 使用 量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標				被害 防止 方法															
									最大値		平均値		接 触	経口		接 触	経口																			
														成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫																
									花粉	花蜜	花粉	花蜜		単回	反復																					
はくさい	アブラムシ類	2 g/株	定植時	-	植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要																
	アオムシ等	3 g/株																																		
	ハイマダラノメイガ	3 g/株																																		
ブロッコリー	アブラムシ類 等	2 g/株			植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要																
ねぎ	アサミウマ類 等	6 g/m ²	生育期 但し、収 穫3日前 まで	-	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要																
にんじん	ハモグリハエ 類	9 g/m ²	は種時	-	播溝 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要																
だいこん	アブラムシ類	6 g/m ²	は種時	-	播溝 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要																
	キスジノミハムシ	6 g/m ²			全面 土壌 混和																															
		9 g/m ²																																		
			6 g/m ²	生育期但 し、収穫 30日前ま で	-	散布																														

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	最大 使用 量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bee)				推計暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
									最大値		平均値		接 触	経口		接 触	経口				
														成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
									花粉	花蜜	花粉	花蜜		単回	反復						
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6 g/m ²	定植時	-	土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要	
非結球あ ぶらな科 葉菜類 (チンゲンサイを 除く)	アブラムシ類 等		は種時	-	播溝 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要	
かぶ						ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要	
ほうれん そう	アブラムシ類					ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要	
だいず えだまめ	フタスジヒメハムシ					ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)														要	
しゅんぎく	ハモクアリハエ類	9 g/m ²	定植時	-	植溝 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要	
いちご	ワタアブラムシ	1 g/株				植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)														要
オクラ	アブラムシ類	9 g/m ²	生育期 但し、収 穫開始 14 日前まで	-	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)														要	
さやえん どう	ハモクアリハエ類					ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)														要	

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用時期	最大 使用 量 (g/10 a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bec)				推計暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
									最大値		平均値		接 触	経口		接 触	経口				
														成虫			幼虫	成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
									花粉	花蜜	花粉	花蜜		単回	反復						
レタス	アブラムシ類 等	2 g/株	定植時	-	植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)														不要	
しそ	マデイロコカイ ガラムシ	2 g/株 (但し、1 m ² 当り 25 g ま で)				ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖施設栽培以外で使用する場合、開花させない)														要	
きく ガーベラ	マメハモグリハ エ	2g/株 (但し、1 m ² 当り 30 g ま で)	定植時	-	植穴 土壌 混和	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖施設栽培での使用に限る)														要	
	コナジラミ類 等	1 g/株 (但し、1 m ² 当り 30 g ま で)																			
	花き類・ 観葉植物 (きく、ガーベ ラを除く)	アブラムシ類	20 g/m ²	生育期	-	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (開花前に収穫する作物以外は、閉鎖施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)														要
コナジラミ類			1 g/株 (但し、1 m ² 当り 30 g ま で)	定植時	-	植穴 土壌 混和															
つつじ類	ツツジゲンバ イ	6 g/m ²	発生初期	-	株元 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (「閉鎖施設栽培での使用または発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」または「発芽 (萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」)														要	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

*被害防止方法として「1.1 kg/10 a を超える場合は、閉鎖施設栽培での使用に限る」を課した上で、実測値を用いた推計暴露量の精緻化を実施

2. 登録番号 20808 : スタークル箱粒剤、
登録番号 20960 : 三井東圧アルバリン箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲(箱育苗)	ウカ類等	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約5 L) 1箱当り 50 g	は種前	1000	育苗箱の 床土又は覆土に均 一に混和する。	土壌 処理	P	0.20	0.057	-	0.00055	0.00021	-	0.042	0.055	0.000063	不要
			は種時覆土前 ～ 移植当日		育苗箱の上から均 一に散布する。												
	ニカメチュウ		移植3日前 ～ 移植当日														

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

3. 登録番号 20811 : スタークル顆粒水溶剤、
 登録番号 20812 : アルバリン顆粒水溶剤、
 登録番号 20813 : ホクコースタークル顆粒水溶剤、
 登録番号 20961 : 三井東圧アルバリン顆粒水溶剤、
 登録番号 22130 : わさび用緑風 SG
 (ジノテフラン 20.0 %水溶剤)

(1) スタークル顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤、ホクコースタークル顆粒水溶剤及び三井東圧アルバリン顆粒水溶剤

(1) - 1 スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率 (倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法																
											接触	経口		接触	経口																			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫																	
稲	カメシ類	2000	150 L/10 a	収穫 7日前まで	散布	茎葉 散布	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価																											
	ウカ類等	3000																																
未成熟とうもろこし	アブラシ類等	2000	300 L/10 a	収穫前日まで	散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要																	
とうもろこし (子実)	ムギクビレアブラシ等																																	
ピーマン	アブラシ類	3000	300 L/10 a	収穫前日まで	散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要																	
	コナジラミ類	2000																																
	アザミウマ類等																																	

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 分投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		接触	成虫/ 単回	成虫/ 反復	
トマト	コナジラミ類	100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約1.5~4.0L)当り0.5L	鉢上時 又は 定植時	灌注	土壌 処理	P	0.26	0.20	0.076	-	0.00073	0.00027	-	0.056	0.073	0.000083	不要
ミニトマト								0.29	0.20	0.084	-	0.00080	0.00030	-	0.062	0.080	0.000091	不要
トマト ミニトマト	コナジラミ類	2000	300 L/10 a	収穫 前日 まで	散布	茎葉 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要
	カメシロ類	2000																
なす	コナジラミ類	2000	300 L/10 a	収穫 前日 まで	散布	茎葉 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要
	アブラムシ類	3000																
	アザミウマ類等	2000																

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
とうがらし類	アブラムシ類	3000	300 L/10 a	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要
	コナジラミ類	2000																
	アザミウマ類等	2000																
とうがらし(葉)	コナジラミ類	2000	300 L/10 a	収穫14日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要
	アブラムシ類	3000																
	アザミウマ類	2000																
かぼちゃ	コナジラミ類等	2000	300 L/10 a	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要
かぼちゃ*	アブラムシ類	100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60 cm・使用土壌約1.5~4.0 L)当り0.5 L (380株/10 a)	定植前日～定植時	灌注	土壌処理	PN	0.076	0.20	0.022	-	0.0032	0.0027	-	0.25	0.33	0.00082	不要

*50穴セル成型育苗トレイを使用した育苗を想定して有効成分投下量を算出

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		接触	成虫/単回	成虫/反復	
きゅうり	アブラムシ類等	2000	300 L/10 a	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要	
	アザミウマ類等	2000																
すいか	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要	
メロン	コナジラミ類	2000	300 L/10 a	収穫3日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要	
	アブラムシ類	3000																
	アザミウマ類	2000																
うり類 (漬物用)	コナジラミ類等	2000	300 L/10 a	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要	
	アブラムシ類	2000																
にがうり	コナジラミ類	2000	300 L/10 a	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要	

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bee)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
ズッキーニ	コナジラミ類	2000	300 L/10 a	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)									要		
	アブラムシ類	3000														要		
まくわうり	コナジラミ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)									要		
きゅうり(葉)	アブラムシ類等	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)									要		
きゅうり(花)	アブラムシ類等	3000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)									要		
ブロッコリー	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)									不要		
	アザミウマ類等	100	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60 cm・使用土壌約1.5~4.0 L)当り0.5 L	定植時	灌注	土壌処理												
はくさい	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布										不要		
	キスジノミハムシ等	2000																

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)				推定暴露量(μg/bee)				推定暴露量/毒性指標				被害防止方法		
														接触	経口		接触	経口						
															成虫			幼虫	成虫/単回	成虫/反復	幼虫			
										最大値(μg/g)	平均値(μg/g)	単回	反復											
								花粉	花蜜	花粉	花蜜													
キャベツ	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)																	
	アブラムシ類等	50	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60 cm・使用土壌約3 L)当り0.5 L	定植前日～定植時	灌注	土壌処理																		
レタス 非結球レタス	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布															セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60 cm・使用土壌約1.5~4.0 L)当り0.5 L	定植前日～定植時	灌注	土壌処理
	ハスモンヨトウ	50	アブラムシ類等																					
	アブラムシ類等																							
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイ、畑わさびを除く) かぶ	アブラムシ類	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布																		
	キスジノミハムシ	2000																						
チンゲンサイ	アブラムシ類	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布																		
	キスジノミハムシ	2000																						
畑わさび	アブラムシ類等	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布																		
わさび	アブラムシ類等	2000	300 L/10	畑育苗期	散布	茎葉散布	PN	0.30	0.010	29				-*	4.4		3.6		-*	340 0.12	440 0.16	1.1 0.00039	不要	
										0.02	0.01	0.02	0.01		0.0016	0.0016	0.0013							

*畑育苗期には開花しないため

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bee)			推定暴露量/毒性指標			被害防止方法					
											接触	経口		接触	経口							
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫				
だいこん	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	※															
	ダイコンハムシ	2000																				
	キスジノミハムシ	1000																				
クレソン	アブラムシ類	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布													ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)	不要		
ねぎ	アザミウマ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布																
	アザミウマ類等	50	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60 cm・使用土壌約1.5~4.0 L)当り0.5 L	定植前日～定植時	灌注	土壌処理																
	クロハネネコノハエ類等	1000	1 L/m ²	生育期但し、収穫14日前まで	株元灌注																	
	アザミウマ類等	400	0.4 L/m ²																			
たまねぎ	アザミウマ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布													ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)	不要		
	ハモグリハエ類	50	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30×60 cm・使用土壌約1.5~4.0 L)当り0.5 L	定植前日～定植時	灌注	土壌処理																
にら	ネギアザミウマ等	2000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布															ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)	不要
	ネギアザミウマ	400	0.4 L/m ²	生育期但し、収穫14日前まで	株元灌注	土壌処理																
	クロハネネコノハエ類	1000	1 L/m ²																			
わけぎ	アザミウマ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布													ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)	不要		
	アザミウマ類等	400	0.4 L/m ²	生育期但し、収穫14日前まで	株元灌注	土壌処理																

ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要
(ミツバチが暴露しないと想定される作物)

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bee)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
アスパラガス	コナジラミ類等	2000	800 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)									要		
らっきょう	アザミヤカ類	2000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)									不要		
さとうきび	アブラムシ類等	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布												
にんじん	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布												
	トビイロヒヨウタンソウムシ等	400	0.4 L/m ²	生育期但し、収穫21日前まで	株元灌注	土壌処理												
セリ	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫14日前まで	散布	茎葉散布												
ほうれんそう	アブラムシ類等	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布												
しゅんぎく	アブラムシ類	3000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布												
みつば	アブラムシ類	3000	300 L/10	収穫3日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで	散布	茎葉散布												

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bee)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
だいず	カメシ類等	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要			
	フタスジヒメハムシ	3000																
あずき	アブラムシ類	3000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要			
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟ささげ、未成熟そらまめを除く)	アブラムシ類等	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要			
えだまめ	カメシ類等	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要			
	フタスジヒメハムシ	3000													要			
未成熟ささげ	アブラムシ類等	2000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要			
さやいんげん	アブラムシ類等	2000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要			
さやえんどう 実えんどう	アブラムシ類等	2000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要			

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bce)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
未成熟そらまめ	アブラムシ類等	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要		
しょうが	クロバネ科/コハエ類	2000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)								不要		
オクラ	アブラムシ類等	2000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要		
ばれいしょ	ワタアブラムシ	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要		
かんしょ	コナジラミ類等	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)								不要		
せり	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布												
せり (水耕栽培)	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布												
すいぜんじな	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布												
モロヘイヤ	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布												
なんてん(葉)	アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)~落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る)								要		
ふき	コナジラミ類	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)								不要		

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当 たりの 有効成 分投下 量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)		推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法		
											接 触	経口		接 触	経口				
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫	
りんご	アブラムシ類等	2000	700 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉 散布	※	ha当 たりの 有効成 分投下 量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)									
もも	アブラムシ類等																		
おうとう	オウトウショウジ ヨウバエ																		
なし	アブラムシ類等																		
かき	カメムシ類等																		
ぶどう	フタテンヒメヨコバエ	3000																	
	カメムシ類等	2000																	
	チャノキイロアザミウマ	1000																	
ラズベリー	アザミウマ類	2000																	
かんきつ	チャノキイロアザミウマ等	1000																	
	ゴマダラカミキリ	1000																	
	アブラムシ類等	2000																	
小粒核果類	アブラムシ類等	2000																	
キウフルーツ	カメムシ類	1000																	
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000																	
びわ	カメムシ類等																		
あけび(果実)	カメムシ類																		
オリーブ																			
オリーブ(葉)																			
茶	チャノボシガ	2000	400 L/10	摘採7日前まで	散布	茎葉 散布	※	ha当 たりの 有効成 分投下 量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)									
てんさい	アブラムシ類等	2000	300 L/10	収穫7日前まで															
	カメノコハムシ	1000																	
	カメノコハムシ等	100	5 L/㎡→ハートポット 6冊(2.5 L/ m2)	移植前	灌注	土壌 処理													
	アブラムシ類等	100	6 L/㎡→ハートポット 6冊(3 L/m2)																

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bee)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
かんきつ(苗木)	ミカンハモクシガ	50	100 mL/株	育苗期	株元灌注	土壌		ミツバチが暴露しないと想定されるため評価不要（閉鎖系施設栽培以外では、開花している場合は摘花してから使用し、使用後は開花期終了まで摘花する								要		
えごま(種子)	カメムシ類	2000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要（閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る）								要		
アマランサス(茎葉)	アブラムシ類	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要（閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る）								要		
しそ(花穂)	アブラムシ類	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要（閉鎖系施設栽培での使用に限る）								要		
しそ科葉菜類(しそ、バジルを除く)	アブラムシ類	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要（閉鎖系施設栽培以外で使用する場合、えごま(葉)については、開花させない、それ以外の作物については、発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る）								要		
しそ	アブラムシ類	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要（閉鎖系施設栽培以外で使用する場合、開花させない）								要		
バジル	アブラムシ類等	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要（閉鎖系施設栽培以外で使用する場合、開花させない）								要		
しょくようほおずき	アブラムシ類等	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要（閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る）								要		
食用ミニバラ 食用カーネーション 食用パンジー 食用金魚草 食用トレニア 食用なでしこ 食用アリウム 食用エキザカム 食用せんいちこう	アブラムシ類等	3000	300 L/10	収穫3日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要（閉鎖系施設栽培での使用に限る）								要		

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
食用コスモス	アブラムシ類等	3000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要(閉鎖系施設栽培での使用に限る)										要
食用ぎく	アブラムシ類等	3000	300 L/10	収穫前日まで	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要(閉鎖系施設栽培での使用に限る)										要
花き類・観葉植物(きくを除く)	アブラムシ類等	2000	300 L/10	発生初期	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要(開花前に収穫する作物以外は、閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要
	ハモグリバエ類	1000	1 L/m ²		灌注	土壌処理		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要(開花前に収穫する作物以外は、閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要
きく	アブラムシ類等	2000	300 L/10	発生初期	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要(閉鎖系施設栽培での使用に限る)										要
	カメムシ類	2000	300 L/10		散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要(閉鎖系施設栽培での使用に限る)										要
	ハモグリバエ類	1000	1 L/m ²		灌注	土壌処理		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要(閉鎖系施設栽培での使用に限る)										要
樹木類(つつじ類、つばき類を除く)	ケムシ類	2000	700 L/10	発生初期	散布	茎葉散布		ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要(「閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)~落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」または「発芽(萌芽)~落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」)										要

作物名	適用場所	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bce)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
												接触	経口		接触	経口			
													成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
つつじ類	－	ツツジゲンバイ等	2000	300 L/10	発生初期	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (「閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」または「発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」)								要			
つばき類		ケムシ類	2000	700 L/10	発生初期	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (「閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」または「発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」)								要			
		チャトカ	100	0.5~2 L/樹(但し、220 L/10 a まで)	発生初期	株元灌注	土壌処理	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (「閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」または「発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る」)								要			
いぐさ		イグサシムシ	1000	150 L/10	発生初期	散布	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要			
いね科* 牧草		アブラムシ類	2000	300 L/10	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価								要			
かき	－	コカイガラムシ類	1	40 g/樹	発芽前～ 発芽期	本剤1 g当り水1 mLの割合で混合し、主幹から主枝の粗皮を環状に剥いた部分に塗布する。	茎葉散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る)								要			
ぶどう		コカイガラムシ類		40 g/樹	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)～落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る)								要						
		クビアカサカシバ		40 g/樹															

*：被害防止方法として「150 L/10 a を超えて使用した場合は、開花前に収穫する」を課した上で、第2段階評価を実施

(2) わさび用緑風 SG

(2) -1 スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの 有効成分 分投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (µg/g)	推定暴露量 (µg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
わさび	アブラムシ類等	2000	200 L/10 a	収穫 14日前 まで	散布	茎葉 散布	PN	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (開花している場合は摘花してから使用し、使用後は開花期終了まで摘花する)										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

4. 登録番号 20814：スタークル粉剤 DL、
登録番号 20815：アルバリン粉剤 DL、
登録番号 20816：ホクコースタークル粉剤 DL、
登録番号 20962：三井東圧アルバリン粉剤 DL
(ジノテフラン 0.50 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫	最大使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 分投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法	
										接触	経口		接触	経口				
											成虫	幼虫		成虫/単 回	成虫/ 反復	幼虫		
稲	ウカ類等	3 kg/10 a	収穫 7日前 まで	散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価											不要
だいず えだまめ	カメシ類等		収穫 7日前 まで			PN	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

5. 登録番号 20836 : スタークルトレボン粉剤 DL
(エトフェンプロックス 0.30 %・ジノテフラン 0.50 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度 (%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bce)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
稲	ウカ類等	3 kg/10 a	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

6. 登録番号 21025 : ホクコーラブサイドスタークル粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・フサライド 2.5 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	いもち病等	4 kg/10 a	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
	什コ類等	4 kg/10 a															

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

7. 登録番号 21027：ビームスタークル粉剤 5 DL
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度 (%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	いもち病等	4 kg/10 a	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
	穂枯れ(ごま葉枯病菌)	4 kg/10 a															

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

8. 登録番号 21191：ビームバシスタークル粉剤 5 DL
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・メプロニル 3.0 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度 (%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	いもち病等	4 kg/10 a	収穫 14日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
	穂枯れ(ごま葉枯病菌)等	4 kg/10 a															

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

9. 登録番号 21228 : 側条オリゼメートスタークル顆粒水和剤
(ジノテフラン 4.0 %・プロベナゾール 48.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bcc)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲	いもち病等	500 g/10 a	移植時	500	ペースト肥料に混合し側条施肥田植機で施用する。	土壌 処理	P	0.20	0.057	-	0.00055	0.00021	-	0.042	0.055	0.000063	不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

10. 登録番号 21248 : スタークル L 粉剤 DL、
登録番号 21435 : スタークルメイト L 粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bec)			推定暴露量/毒性指標			被害防止方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
稲	ウカ類等	3 kg/10 a	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価										不要
	カミシ類	4 kg/10 a															

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

1 1. 登録番号 21259 : スタークル液剤 10、
登録番号 21260 : スタークルメイト液剤 10、
登録番号 24582 : アルバリン液剤 10
(ジノテフラン 10.0 %液剤)

(1) スタークル液剤 10 及びスタークルメイト液剤 10

(1) -1 スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使 用量	使用 時期	使用方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法	
											接触	経口		接触	経口				
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫		
稲	ウカ類	30	3 L/10 a	収穫7日 前まで	無人航空機 による散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価											不要
	ウカ類等	16	1.6 L/10 a		散布														
	ウカ類等	1000	150 L/10 a		散布														
	ウカ類等	300	25 L/10 a		散布														
	ウカ類等	8	0.8 L/10 a		無人航空機 による散布														
	ウカ類等	30	3 L/10 a		空中散布														

作物名	適用 病害虫	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 分投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)		推定暴露量/毒性指標			被害 防止 方法										
											接触	経口		接触	経口											
												成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫								
小麦	アブラムシ類	1000	150 L/10 a	収穫7日 前まで	散布	茎葉 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)									不要										
		8	0.8 L/10 a																							
だいこん		8	1.6 L/10 a	収穫3日 前まで	無人航 空機 による 散布																					
キャベツ																										
ブロッコリー																										
ねぎ	アザミウマ類	10																								
さとうきび	カンショハネカガメムシ等	1000	300 L/10 a	収穫7日 前まで	散布												ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (発芽(萌芽)~落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る)									要
		14	2.4 L/10 a																							
らっきょう	アザミウマ類等	8	1.6 L/10 a	収穫前 日まで	無人航 空機 による 散布																					
かんしょ	アブラムシ類			収穫3日 前まで																						
はくさい																										
レタス 非結球レタス																										
かき	カメムシ類	20	8 L/10 a	収穫前 日まで	無人航 空機 による 散布																					

作物名	適用 病虫害	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当りの有効成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法	
											接触	経口		接触	経口				
												成虫	幼虫		成虫/単 回	成虫/ 反復	幼虫		
いね科牧草*	アブラムシ類	1000	300 L/10 a	収穫 7日前 まで	散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価											要
だいず えだまめ	カメムシ類等	1000	300 L/10 a	収穫 7日前 まで	散布		PN	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要
		8	0.8 L/10 a		無人航 空機 による 散布			ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (開花期終了後の使用に限る)											

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花)

*：被害防止方法として「150 L/10 a を超えて使用した場合は、開花前に収穫する」を課した上で、第2段階評価を実施

(以下の適用はスタークルメイトのみ)

作物名	適用病虫害	最小希 釈倍率 (倍)	最大使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの 有効成分投 下量(kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
そてつ	ソテツロカイガラムシ	5	800 mL/株	新葉 展開前	株元 灌注	土壌 処理	P	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (開花している場合は摘花してから使用し、使用後は開花期終了まで摘花する)										不要

(2) アルバリン液剤 10
(2) -1 スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
小麦	アブラムシ類	8	0.8 L/10 a	収穫7日 前まで	無人航空機 による散布	茎葉 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)										不要	
だいこん		8	1.6 L/10 a	収穫3日 前まで														
キャベツ																		
ブロッコリー																		
ねぎ	アザミウマ類	10																
かんしょ	アブラムシ類	8																
はくさい																		
レタス 非結球レタス																		
かき	カメムシ類	20	8 L/10 a	収穫前 日まで			ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (発芽(萌芽)~落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る)											要

1 2. 登録番号 21276 : スタークル 1 キロ H 粒剤、
登録番号 21277 : スタークルメイト 1 キロ H 粒剤
(ジノテフラン 3.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲	ウカ類等	1 kg/10 a	出穂5日前まで	1000	散布	土壌 処理	P	0.30	0.086	-	0.00083	0.00031	-	0.064	0.083	0.000094	不要
				無人航空機 による散布													

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

1 3. 登録番号 21496：ビルダースタークル箱粒剤、
登録番号 21497：ホクコービルダースタークル箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲(箱育苗)	イネノミミシ等	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約5 L) 1箱当り 50 g	移植3日前 ～ 移植当日	1000	育苗箱の上から均 一に散布する。	土壌 処理	P	0.20	0.057	-	0.00055	0.00021	-	0.042	0.055	0.000063	不要
	ウカ類等		緑化期 ～ 移植当日														

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

1 4. 登録番号 21607：スタークルエア－50、
登録番号 21608：スタークルメイトエア－50、
登録番号 24012：ファームスター顆粒水溶剤 50
(ジノテフラン 50.0 %水溶剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使用 量	使用 時期	使用方法	暴露 シナ リオ	※	ha当りの 有効成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接 触	経口		接 触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
稲	カメムシ類等	40	0.8 L/10 a	収穫 7日前 まで	無人ヘリコプター による散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
					空中散布													

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

15. 登録番号 21710 : ホクコーラブサイドスタークルフロアブル
(ジノテフラン 5.0%・フサライド 12.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使用 量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
稲	いもち病等	500	150 L/10 a	収穫 7日 前 まで	散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価										不要
	いもち病等	150	25 L/10 a															
	いもち病等	4	0.8 L/10 a		無人ヘリコプターによる散布			ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (開花期終了後の使用に限る)										要
		原液	0.2 L/10 a		空中散布													

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

16. 登録番号 21801 : ワイドナーエース粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・ブプロフェジン 1.0 %・フサライド 2.5 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bcc)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	紋枯病等	4 kg/10 a	収穫 14日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

17. 登録番号 21871：コラトップスタークル1キロ粒剤
(ジノテフラン 5.0 %・ピロキロン 15.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病虫害名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bec)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲	いもち病等	1 kg/10 a	出穂5日 前まで	1000	散布	土壌 処理	P	0.50	0.14	-	0.0014	0.00052	-	0.11	0.14	0.00016	不要
				無人航空機 による散布													

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

18. 登録番号 21886：イモチエーススタークル粒剤、
登録番号 21888：ホクコーイモチエーススタークル粒剤
(ジノテフラン 1.67 %・メトミノストロビン 4.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bcc)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲	いもち病等	3 kg/10 a	収穫35日前まで	3000	湛水散布	土壌 処理	P	0.50	0.14	-	0.0014	0.00052	-	0.11	0.14	0.00016	不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

19. 登録番号 21975：トレボンスター粉剤 DL

(エトフェンプロックス 0.40 %・ジノテフラン 0.20 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度 (µg/g)	推定暴露量 (µg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	ニカメイチュウ等	4 kg/10 a	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価								不要		
	ウカ類等	4 kg/10 a															
だいず	カメシ類等	4 kg/10 a	収穫14日前まで				ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)								要		

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

20. 登録番号 22036：ビームエイトスタークルゾル

(ジノテフラン 10.0 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使 用量	使用時 期	使用方 法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
稲	いもち病等	1000	150 L/10 a	収穫 7日前 まで	散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
		250	25 L/10 a															
		8	0.8 L/10 a		無人航空機 による散布													

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

2 1. 登録番号 22037 : トレボンスターフロアブル
(エトフェンプロックス 7.0 %・ジノテフラン 3.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	カメシ類等	1000	150 L/10 a	収穫14日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価										不要
	カメシ類	300	25 L/10 a		無人航空機による散布													
	カメシ類等	8	0.8 L/10 a															
だいず	カメシ類				ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要			

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

2 2. 登録番号 22063 : 日農ビームアプロードスタークル粉剤 5 DL、
登録番号 22064 : クミアイビームアプロードスタークル粉剤 5 DL
(ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.0 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度 (%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	ウカ類等	4 kg/10 a	収穫 14日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

2 3. 登録番号 22102：ビームモンセレンスタークル粉剤 5 DL
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度 (%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
稲	いもち病等	4 kg/10 a	収穫 21日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

2 4. 登録番号 22180：サジェスト微粒剤 F
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・ペンシクロン 1.5 %粉粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度 (%)	推定花粉・花蜜濃度 (µg/g)	推定暴露量 (µg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	いもち病等	4 kg/10 a	収穫 21日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

2 5. 登録番号 22268 : ビームモンカットスタークル F 粉剤 5 DL

(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bec)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
稲	いもち病等	4 kg/10 a	収穫 14日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

2 6. 登録番号 22332 : スタークル豆つぶ、

登録番号 22333 : クミアイスタークル豆つぶ、

登録番号 22495 : スタークルメイト豆つぶ

(ジノテフラン 12.0 %剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナリオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
									接 触	経口		接 触	経口			
										成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
稲	カメシ類等	250 g/10 a	収穫 7日前 まで	散布	土壌 処理	P	0.30	0.086	-	0.00083	0.00031	-	0.064	0.083	0.000094	不要
	ウカ類等	500 g/10 a					0.60	0.17	-	0.0017	0.00062	-	0.13	0.17	0.00019	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

27. 登録番号 22416 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤、
登録番号 22417 : 明治 Dr. オリゼスタークル箱粒剤、
登録番号 23950 : オリザエートスター箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 25.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)			推計暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
稲(箱育苗)	いもち病等	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約5 L) 1箱当り 50 g	緑化期 ～ 移植当日	1000	育苗箱の上から均 一に散布する。	土壌 処理	P	0.20	0.057	-	0.00055	0.00021	-	0.042	0.055	0.000063	不要
	フタヒコヤガ		移植3日前 ～ 移植当日														

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

28. 登録番号 22426 : ビームスタークル微粒剤 F
(ジノテフラン 0.35 %・トリシクラゾール 0.50 %粉粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bec)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	いもち病等	4 kg/10 a	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

29. 登録番号 22479：ダブルカットスタークル粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.11 %・トリシクラゾール 0.50 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度 (µg/g)	推定暴露量 (µg/bee)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
稲	いもち病等	4 kg/10 a	穂揃期まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
	ニカメイチュウ	4 kg/10 a															

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

30. 登録番号 22642：ホクコートップジンスタークル粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・チオファネートメチル 2.0 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度 (%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)		推定暴露量/毒性指標				被害防止方法	
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復		幼虫
稲	いもち病等	4 kg/10 a	収穫14日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

3 1. 登録番号 22660 : MIC ビルダーフェルテラスタークル箱粒剤

(クロラントラニプロール 0.75 %・ジノテフラン 2.0 %・プロベナゾール 10.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲(箱育苗)	白葉枯病等	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約5 L) 1箱当り 50 g	移植3日前 ～ 移植当日	1000	育苗箱の上から均 一に散布する。	土壌 処理	P	0.20	0.057	-	0.00055	0.00021	-	0.042	0.055	0.000063	不要
	いもち病等		緑化期 ～ 移植当日														

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

3 2. 登録番号 22661 : クミアイアプロードスタークルゾル、

登録番号 22662 : アプロードスタークルゾル

(ジノテフラン 9.0 %・ブプロフェジン 18.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使 用量	使用 時期	使用方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
稲	ウカ類等	1000	150 L/10 a	収穫 7日前 まで	散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」と評価										不要
		8	0.8 L/10 a		無人航空機 による散布													

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

3 3. 登録番号 22725 : キックオフ顆粒水和剤

(クロラントラニプロール 4.0 %・ジノテフラン 15.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病虫害	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当りの 有効成 分投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bec)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
なし	カメシ類等	2000	700 L/10 a	収穫前日 まで	散布	茎葉 散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)~落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る)										不要	
もも ネクタル	シクイムシ類等			収穫3日前 まで														
うめ	ケムシ類等			収穫14日前 まで														
かき	コナカイガラムシ 類等			収穫前日 まで														
さとうきび	カンシャコハネ カガメシ等		300 L/10 a	収穫30日前 まで			ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (ミツバチが暴露しないと想定される作物)										不要	
キャベツ	アブラムシ類等	100	セル成型育 レイ1箱また ーバーポット 1冊 (30× cm・使用 量約1.5~4.0 当り0.5 L	定植前日 ～ 定植時	灌注	土壌 処理												
はくさい	アブラムシ類等																	
ブロッコリー	アブラムシ類等																	
レタス	アブラムシ類等																	
非結球レタス	アブラムシ類等																	
ねぎ	ハモグリバエ類 等																	

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

3 4. 登録番号 22784 : アプロードモンカットスタークル F 粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・ブプロフェジン 1.5 %・フルトラニル 2.0 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	紋枯病等	4 kg/10 a	収穫 14日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

3 5. 登録番号 22924 : ホクコートップジンスタークルフロアブル
(ジノテフラン 5.0 %・チオファネートメチル 20.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使 用量	使用 時期	使用方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 分投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bec)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
稲	いもち病等	500	150 L/10 a	収穫 14日前 まで	散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
		150	25 L/10 a															
	いもち病等	4	0.8 L/10 a		無人航空機 による散布													
		15	3 L/10 a		空中散布													

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

3 6. 登録番号 22981：ダブルカットバリダスタークル粉剤 3 DL

(ジノテフラン 0.35 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bec)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	いもち病等	4 kg/10 a	穂揃期まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
	ニカメイチュウ	4 kg/10 a															

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

3 7. 登録番号 22995：ダブルカットスタークルフロアブル

(ジノテフラン 10.0 %・カスガマイシン 1.37 %・トリシクラゾール 8.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使用 量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bec)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法	
											接触	経口		接触	経口				
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫		
稲	いもち病等	1000	150 L/10 a	穂揃期 まで	散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要	
		300	25 L/10 a		無人航空機 による散布														
		8	0.8 L/10 a		空中散布														

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

38. 登録番号 23074 : アトラクトン箱粒剤、
登録番号 23075 : スターダム箱粒剤
(ジノテフラン 12.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bec)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲 (箱育苗)	カメシ類	育苗箱(30×60×3 cm、使用 土壌約5 L)1箱当り 50 g	移植当日	1000	育苗箱の上 から均一に 散布する。	土壌 処理	P	1.2	0.34	-	0.0033	0.0012	-	0.25	0.33	0.00038	不要
		高密度には種する場合は1 kg/10 a(育苗箱(30×60×3 cm、使用土壌約5 L) 1箱当り 50~100 g)															
	ウカ類等	育苗箱(30×60×3 cm、使用 土壌約5 L)1箱当り 50 g	移植3日前 ～ 移植当日														

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

39. 登録番号 23076 : Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、
登録番号 23077 : 明治 Dr. オリゼスタークル箱粒剤 OS、
登録番号 23078 : ロングリーチ箱粒剤
(ジノテフラン 12.0 %・プロベナゾール 24.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bec)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲 (箱育苗)	カメシ類	育苗箱(30×60×3 cm、使用 土壌約5 L)1箱当り 50 g	移植当日	1000	育苗箱の上 から均一に 散布する。	土壌 処理	P	1.2	0.34	-	0.0033	0.0012	-	0.25	0.33	0.00038	不要
	ウカ類等		移植3日前 ～ 移植当日														

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

40. 登録番号 23113：イッカツエース粉剤 DL

(ジノテフラン 0.35 %・テブフェノジド 0.75 %・カスガマイシン 0.34 %・トリシクラゾール 0.50 %・バリダマイシン 0.30 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度 (%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)		推定暴露量/毒性指標			被害防止方法		
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回		成虫/反復	幼虫
稲	いもち病等	4 kg/10 a	穂揃期まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価							不要			

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

41. 登録番号 23365：フェルテラスタークル箱粒剤 CU

(クロラントラニリプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナリオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
稲 (箱育苗)	ウカ類等	育苗箱(30×60×3 cm、使用土 壌約5 L)1箱当り 50 g	は種前	1000	育苗箱の 上から均 一に散布 する。	土壌 処理	P	0.60	0.17	-	0.0017	0.00062	-	0.13	0.17	0.00019	不要
		高密度には種する場合は1 kg/10 a(育苗箱(30×60×3 cm、使用土壌約5 L) 1箱当り 50~100 g)															
		育苗箱(30×60×3 cm、使用土 壌約5 L)1箱当り 50 g	は種時覆土前 ～ 移植当日														
	ツマグロヨコバイ	高密度には種する場合は1 kg/10 a(育苗箱(30×60×3 cm、使用土壌約5 L) 1箱当り 50~100 g)	移植3日前 ～ 移植当日														

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

4 2. 登録番号 23370 : スケルカット顆粒水和剤、
登録番号 23371 : スケルノック顆粒水和剤
(ジノテフラン 40.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

・スケルカット顆粒水和剤

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	適用作物の 花粉・ 花蜜の 有無	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中 有効成分 濃度(%)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
											接 触	経口		接 触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
りんご	コナカイガラムシ類	2000	700 L/10 a	収穫前日まで	散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)~落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る)											要	
	シクイムシ類	2000																

・スケルノック顆粒水和剤

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	適用作物の 花粉・ 花蜜の 有無	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中 有効成分 濃度(%)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
											接 触	経口		接 触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
りんご	コナカイラムシ類	2000	700 L/10 a	収穫前日まで	散布	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または発芽(萌芽)~落花(開花終了)までを除く期間の使用に限る)										要		

4 3. 登録番号 23372 : スターガードプラス AL
(ジノテフラン 0.010 %・ペンチオピラド 0.010 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍数	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	適用作物の 花粉・ 花蜜の 有無	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
									接 触	経口		接 触	経口			
										成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
なす	うどんこ病等	原液	収穫前日まで	散布	エアゾル剤等、一度に広範囲かつ多量に使用されることがないため暴露量の推計不要									不要		
ピーマン	うどんこ病等															
トマト ミニトマト	葉かび病等															
オクラ さやいんげん さやえんどう 実えんどう	アブラムシ類															
きゅうり	うどんこ病等															
すいか	アブラムシ類		収穫7日前まで													
メロン	コナジラミ類		収穫3日前まで													
キャベツ	アブラムシ類															
はくさい	アブラムシ類															
ブロッコリー	アブラムシ類															
レタス 非結球レタス	アブラムシ類															
ねぎ	アザミウマ類等		収穫7日前まで													
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟さやげを除く)	アブラムシ類															
えだまめ	アブラムシ類等														収穫7日前まで	

作物名	適用 病虫害名	最小 希釈 倍数	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	適用作物の 花粉・ 花蜜の 有無	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
									接 触	経口		接 触	経口			
										成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
未成熟ささげ	アブラムシ類		収穫前日まで													
かんきつ	ミカンハモグリガ		収穫前日まで													
りんご	アブラムシ類等															
なし	ケムシ類等															
かき	コナカイガラムシ類															
ぶどう	コナカイガラムシ類等															
うめ もも	アブラムシ類		収穫7日前まで											収穫前日まで		
おうとう	カメムシ類															
ばら	うどんこ病等		発生初期													
花き類・観葉植物 (ばらを除く)	うどんこ病等															
樹木類(つつじ類、 つばき類を除く)	ケムシ類等															
つばき類	ケムシ類等															
つつじ類	ケムシ類等															

4 4. 登録番号 23405 : トライスタークル粉剤 DL、
登録番号 23407 : クミアイトライスタークル粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・テブフロキン 1.0 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	いもち病等	4 kg/10 a	収穫14日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

4 5. 登録番号 23506 : オールスタースプレー
(ジノテフラン 0.010 %液剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍数	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	適用作物の 花粉・ 花蜜の 有無	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
									接 触	経口		接 触	経口			
										成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
ピーマン	コジラミ類等	原液	収穫前日まで	希釈せず そのまま 散布する												
トマト ミニトマト	コジラミ類等															収穫7日前まで
なす	アザミウマ類等															
すいか	アブラムシ類		収穫14日前まで													
とうがらし類	コジラミ類等															収穫前日まで
とうがらし(葉)			コジラミ類													
にがうり	アブラムシ類等															収穫前日まで
かぼちゃ			アブラムシ類													
ズッキーニ	コジラミ類等															収穫前日まで
メロン			アブラムシ類等													
きゅうり	アブラムシ類等															収穫前日まで
はくさい			アブラムシ類													
ブロッコリー	アブラムシ類															収穫3日前まで
キャベツ			アブラムシ類													
非結球あぶらな科葉菜 類(チンゲンサイ、畑わさびを 除く) かぶ	アブラムシ類															収穫7日前まで
チンゲンサイ			アブラムシ類													
畑わさび	アブラムシ類															収穫7日前まで
だいこん			アブラムシ類等													

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍数	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	適用作物の 花粉・ 花蜜の 有無	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
									接 触	経口		接 触	経口			
										成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
レタス 非結球レタス	アブラムシ類		収穫3日前まで													
ねぎ	アザミウマ類															
にら	アブラムシ類等															
アスパラガス	アザミウマ類等															
らっきょう	アザミウマ類															
未成熟とうもろこし	アブラムシ類等															
セリー	アブラムシ類		収穫14日前まで													
にんじん			収穫7日前まで													
だいず えだまめ	カメムシ類等		収穫7日前まで													
実えんどう さやえんどう	アブラムシ類等		収穫前日まで													
さやいんげん	アブラムシ類等															
オクラ	アブラムシ類等															
しょうが	クロハネキノコバエ類															
てんさい	アブラムシ類等		収穫7日前まで													
ばれいしょ	ワタアブラムシ		収穫3日前まで													
かんしょ	アブラムシ類等															
すいぜんじな	アブラムシ類		収穫7日前まで													
ふき	コナシムシ類		収穫前日まで													
りんご	アブラムシ類等															
もも ネクタリン	アブラムシ類等															
なし	アブラムシ類等															
かんきつ	アブラムシ類等															
小粒核果類	アブラムシ類等															
マンゴー	チャノキイロアザミウマ															
キウイフルーツ	カメムシ類															

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍数	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	適用作物の 花粉・ 花蜜の 有無	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
									接 触	経口		接 触	経口			
										成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
かき	カメシ類等															
ぶどう	カメシ類等															
おうとう	オウトウショウジョウハエ等															
びわ	カメシ類等															
あけび(果実)	カメシ類		収穫14日前まで											発生初期		
花き類・観葉植物(きくを除く)	アブラムシ類等															
きく	アブラムシ類等															
樹木類(つつじ類、つばき類を除く)	ケムシ類															
つつじ類	ケムシ類等															
つばき類	ケムシ類															

46. 登録番号 23624 : ウッドスター、
登録番号 23676 : ウッドセーバー
(ジノテフラン 8.0 %液剤)

(1) ウッドスター

(1) -1 スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	適用作物の 花粉・ 花蜜の 有無	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中 有効成分 濃度(%)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bce)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
											接 触	経口		接 触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
樹木類(つばき類を除く)	ケムシ類	原液	*	幼虫発生前~発生初期 但し新葉展開後	樹幹 注入													
くすのき	クスベニヒラタスミカメ			幼虫発生前~発生初期														
アメリカワ	イガ類			幼虫発生前~発生初期 但し新葉展開後														
さくら			クビアカツカミキリ	新葉展開後~落葉前まで														
つばき類	チャドクガ		**	幼虫発生前~発生初期														
ブラタス	ブラタスゲンハイ			新葉展開後														
ぶな	ブナハバチ			新葉展開直前														
ひのき	チャバネカメムシ		***	成虫飛来前														

* : 胸高直径 6 cm~10 cm : 8~12 mL、10 cm~20 cm : 12~24 mL、20 cm~30 cm : 24~36 mL、30 cm~40 cm : 36~48 mL、40 cm~50 cm : 48~60 mL、50 cm~60 cm : 60~72 mL、以降、直径が10 cm増す毎に12 mLを追加する

** : 注入部直径 6 cm~10 cm : 2 mL、10 cm~20 cm : 2~12 mL、20 cm~30 cm : 12~18 mL、30 cm~40 cm : 18~24 mL、40 cm~50 cm : 24~30 mL、50 cm~60 cm : 30~36 mL、以降、直径が10 cm増す毎に6 mLを追加する

*** : 注入部直径 6 cm~8 cm : 8 mL、8 cm~11 cm : 12 mL、11 cm~14 cm : 16 mL、14 cm~17 cm : 20 mL、17 cm~20 cm : 24 mL、以降、直径が3 cm増す毎に4 mLを追加する

(2) ウッドセーバー

(2) -1 スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	適用作物の 花粉・ 花蜜の 有無	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中 有効成分 濃度(%)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bcc)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
											接 触	経口		接 触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
デコ	デコヒメコバチ	原液	*	成虫発生前又は虫えい形成期	樹幹 注入												要	
	発生前~発生初期																	
カシエマル	オキナワチモンシハムシ																	

* : 胸高直径 6 cm~10 cm : 15~30 mL、10 cm~20 cm : 30~60 mL、以降、直径が10 cm増す毎に30~60 mLを追加する

4 7. 登録番号 23685 : ハイポネックス原液 殺虫剤入り
(ジノテフラン 2.5 %複合肥料)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍率 (倍)	最大 使用 液量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中 有効成分 濃度(%)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bce)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
											接 触	経口		接 触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
花き類・観葉植物	アブラムシ類	250	2000	発生初期	灌注	土壌 処理	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (開花前に収穫する作物以外は、閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)											要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

4 8. 登録番号 23705 : サンプラススタークル箱粒剤
(ジノテフラン 2.0 %・トルプロカルブ 12.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲(箱育苗)	イネノメイシ等	育苗箱 (30×60×3 cm 使用土壌約5 L) 1箱当り 50 g	移植3日前 ～ 移植当日	1000	育苗箱の上から均 一に散布する。	土壌 処理	P	0.20	0.057	-	0.00055	0.00021	-	0.042	0.055	0.000063	不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

49. 登録番号 23706 : ガッツスター粒剤、
登録番号 23707 : ゴウケツモンスター粒剤
(ジノテフラン 1.67 %・シメコナゾール 1.5 %・トルプロカルブ 3.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法	
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復		幼虫
稲	カメムシ類等	3 kg/10 a	出穂5日前まで 但し、収穫30日前まで	3000	湛水散布	土壌 処理	P	0.50	0.14	-	0.0014	0.00052	-	0.11	0.14	0.00016	不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

50. 登録番号 23708 : サントリプル箱粒剤、
登録番号 23840 : サンフェスタ箱粒剤
(クロラントラニプロール 0.75 %・ジノテフラン 6.0 %・トルプロカルブ 4.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bec)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
稲 (箱育苗)	カメノキ類等	育苗箱(30×60×3 cm、使用 土壌約5 L)1箱当り 50 g 高密度には種する場合は1 kg/10 a(育苗箱(30×60×3 cm、使用土壌約5 L) 1箱当り 50~100 g)	移植3日前 ～ 移植当日	1000	育苗箱の上 から均一に 散布する。	土壌 処理	P	0.60	0.17	-	0.0017	0.00062	-	0.13	0.17	0.00019	不要
稲	いもち病等	1 kg/10 a	移植時		側条施用												

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

5 1. 登録番号 23833 : ハイパーキック箱粒剤、
登録番号 23834 : ゴウケツバスター箱粒剤
(ジノテフラン 12.0 %・トルプロカルブ 9.0 %粒剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最大 使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bec)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
										接 触	経口		接 触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
稲 (箱育苗)	カメシ類	育苗箱(30×60×3 cm、使用 土壌約5 L)1箱当り 50 g	移植当日	1000	育苗箱の上 から均一に 散布する。	土壌 処理	P	1.2	0.34	-	0.0033	0.0012	-	0.25	0.33	0.00038	不要
		高密度には種する場合は1 kg/10 a(育苗箱(30×60×3 cm、使用土壌約5 L) 1箱当り 50~100 g)	移植3日前 ~ 移植当日														
	ウカ類等	育苗箱(30×60×3 cm、使用 土壌約5 L)1箱当り 50 g	移植当日														
稲	いもち病等	1 kg/10 a	移植時		側条施用												

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

5 2. 登録番号 24316 : アースガーデン 4

(エトフェンプロックス 0.020 %・ジノテフラン 0.010 %・ミルベメクチン 0.00050 %・ペンチオピラド 0.010 %水和剤)

(1) -1 スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	最小 希釈 倍数	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	適用作物の 花粉・ 花蜜の 有無	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計 花粉・ 花蜜 濃度 (μg/g)	推計暴露量 (μg/bee)		推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
									接 触	経口		接 触	経口			
										成虫	幼虫		成虫/ 単回		成虫/ 反復	幼虫
花き類・観葉植物(ば ら、ひまわりを除く)	アブラムシ類等	原液	発生 初期	希釈せず そのまま 散布する					エアゾル剤等、一度に広範囲かつ多量に使用されることがないため暴露量の推計不要							不要
ばら	アブラムシ類等															
ひまわり	アブラムシ類等															
樹木類(つつじ類、つば き類、ひいらぎもくせ い、まさきを除く)	アブラムシ類等															
つばき類 (さざんかを除く)	アブラムシ類等															
さざんか	アブラムシ類等															
まさき	アブラムシ類等															
ひいらぎもくせい	アブラムシ類等															
つつじ類	アブラムシ類等															

5 3. 登録番号 24344 : スタートレボン W10

(エトフェンプロックス 10.0 %・ジノテフラン 10.0 %乳剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	いもち病等	1000	150 L/10 a	収穫14日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
		8	0.8 L/10 a		無人航空機による散布													
だいず えだまめ	かみし類	1000	150 L/10 a	収穫14日前まで	散布		P	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)										要
		8	0.8 L/10 a		無人航空機による散布													

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

5 4. 登録番号 24346 : ブレードスタークルゾル

(ジノテフラン 10.0 %・フェリムゾン 15.0 %・フサライド 15.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使 用量	使用 時期	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
稲	いもち病等	1000	150 L/10 a	収穫 7日前 まで	散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
		300	25 L/10 a															
		8	0.8 L/10 a		無人航空機 による散布													

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

5 5. 登録番号 24347 : ブレードスタークル粉剤 DL
(ジノテフラン 0.35 %・フェリムゾン 2.0 %・フサライド 1.5 %粉剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量 (kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bee)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
										接触	経口		接触	経口			
											成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	いもち病等	4 kg/10 a	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

56. 登録番号 24413 : マグアンプ K 殺虫剤入り
(ジノテフラン 0.20 %複合肥料)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用 病害虫名	使用量	使用 時期	最大 使用量 (g/10a)	使用 方法	暴露 シナ リオ	※	有効 成分 投下量 (kg ai/ha)	推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				推計暴露量 (μg/bee)			推計暴露量/毒性指標			被害 防止 方法		
									推計花粉・花蜜濃度(μg/g)				接 触	経口		接 触	経口				
														成虫			幼虫	成虫/		幼虫	
														単回	反復			単回			反復
なす	アブラムシ類等	5g/株 (1000株 /10 a)	定植時	5000	植穴土壌混和	土壌 処理	P	0.10	0.029				-	0.00028		0.00010	-	0.021	0.028	0.000031	不要
	アブラムシ類等		生育期 但し、収穫前日まで		株元散布																
ピーマン	アブラムシ類	5g/株* (1700株 /10 a)	定植時	5500	植穴土壌混和	土壌 処理	PN	0.11	0.049 0.10 0.029 0.058 0.014				-	0.0073 0.0050 0.0026 0.0038		0.0060	-	0.56 0.39	0.73 0.26	0.0018 0.0012	要
ピーマン		5g/株 (1700株 /10 a)	生育期 但し、収穫前日まで	-	株元散布		【ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)														要
きゅうり	アブラムシ類等	5g/株 (1100株 /10 a)	定植時	5500	植穴土壌混和	土壌 処理	PN	0.11	0.032 0.10 0.029 0.058 0.014				-	0.0047 0.0050 0.0026 0.0038		0.0039	-	0.36 0.39	0.47 0.26	0.0012 0.0012	不要
			生育期 但し、収穫開始14日 前まで		株元散布																
きゅうり							【ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)														要
トマト	アブラムシ類等	5g/株 (1900株 /10 a)	定植時	9500	植穴土壌混和	土壌 処理	P	0.19	0.055				-	0.00052		0.00020	-	0.040	0.052	0.000060	不要
			生育期 但し、収穫前日まで		株元散布																
ミニトマト	アブラムシ類等	5g/株 (2100株 /10 a)	定植時	10500	植穴土壌混和	土壌 処理	P	0.21	0.060				-	0.00058		0.00022	-	0.045	0.058	0.000066	不要
			生育期 但し、収穫前日まで		株元散布																
いちご	ワタアブラムシ	5g/株	定植時		植穴土壌混和	土壌 処理	【ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (閉鎖系施設栽培での使用に限る)														要
花き類・ 観葉植物	アブラムシ類	5g/株	生育期		株元散布	土壌 処理	ミツバチが暴露しないと想定されるため暴露量の推計不要 (開花前に収穫する作物以外は、閉鎖系施設栽培での使用または開花期終了後の使用に限る)														要
		100 g/m ²																			

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

*被害防止方法として「5.5 kg/10 a を超える場合は、閉鎖系施設栽培での使用に限る」を課した上で、実測値を用いた推計暴露量の精緻化を実施

5 7. 登録番号 24530 : オークストラスタークルエアー
(ジノテフラン 9.0 %・ベンズピリモキサン 10.0 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病虫害	最小希釈倍率(倍)	最大使用量	使用時期	使用方法	暴露シナリオ	※	ha当たりの有効成分投下量(kg ai/ha)	散布液/粉中有効成分濃度(%)	推定花粉・花蜜濃度(μg/g)	推定暴露量(μg/bce)			推定暴露量/毒性指標				被害防止方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/単回	成虫/反復	幼虫	
稲	ツマク [®] ロヨコバイ等	1000	150 L/10 a	収穫7日前まで	散布	茎葉散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
		250	25 L/10 a		無人航空機による散布													
		16	1.6 L/10 a															
		8	0.8 L/10 a															

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)

5 8. 登録番号 24608 : ブレードスタークル R ゾル
(ジノテフラン 9.0 %・フェリムゾン 13.5 %・フサライド 13.5 %水和剤)

(1) スクリーニング段階

作物名	適用病害虫	最小希 釈倍率 (倍)	最大使 用量	使用時 期	使用方 法	暴露 シナ リオ	※	ha当たりの有効成分 分投下量 (kg ai/ha)	散布液/ 粉中有 効成分 濃度(%)	推定花 粉・花 蜜濃度 (μg/g)	推定暴露量 (μg/bce)			推定暴露量/毒性指標				被害 防止 方法
											接触	経口		接触	経口			
												成虫	幼虫		成虫/ 単回	成虫/ 反復	幼虫	
稲	いもち病等	1000	150 L/10 a	収穫 7日前 まで	散布	茎葉 散布	P	【第2段階評価】 「ミツバチの群の維持に支障を及ぼすおそれはない」 と評価										不要
		300	25 L/10 a															
		8	0.8 L/10 a		無人航空機 による散布													

※：適用作物の花粉・花蜜の有無 (P：花粉, N：花蜜)